

## Trabalho apresentado no 15º CBCENF

**Título:** ESTUDO DA TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN  
**Relatoria:** LUANA KÁTIA SANTOS OLIVEIRA  
**Autores:** Alcivan Nunes Vieira  
Lais Cristina da Silva Lima  
**Modalidade:** Pôster  
**Área:** Determinantes de vida e trabalho  
**Tipo:** Pesquisa  
**Resumo:**

**Introdução:** A Tuberculose é uma doença milenar, que ainda hoje, é considerada um importante problema para a saúde mundial. Sua disseminação no mundo foi favorecida pelos movimentos migratórios loco-regionais e intercontinentais, associados às precárias condições de vida das populações, de forma mais acelerada com o advento do modo de produção capitalista. Devemos considerar o problema da desigualdade social como um dos principais fatores para a ocorrência da doença, à qual tem se estabelecido de forma assustadora nos países subdesenvolvidos. **Objetivos:** Este estudo teve por objetivo, traçar o perfil dos casos de tuberculose no município de Mossoró-RN. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal, descritivo e analítico com abordagem quantitativa, realizado a partir de dados contidos nas Fichas de Notificação/Investigação para Tuberculose do SINAN, no período de 2008 a 2010. **Resultados:** Foram analisadas 316 notificações, e, a partir dessas, viu-se que a Tuberculose acomete, na maioria dos casos homens, os quais representam 63,6% do total; adultos em faixa etária de 40 a 59 anos, sendo estes 38,6% dos casos; com escolaridade baixa, na qual 23,7% cursaram, apenas, da 1ª a 4ª série incompleta; e dos casos, a maioria, 87,7% tem procedência urbana. **Conclusões:** A doença tem prevalência nos adultos em faixa etária economicamente produtiva, no sexo masculino, sendo predominantemente urbana e atingindo pessoas com escolaridade baixa. Tal acontecido pode ter ligação com más condições de trabalho e disseminação da TB nesse espaço, baixo nível de informação sobre a doença, resistência em procurar o serviço de saúde por desconsiderar os sintomas, más condições de moradia, dentre outros. A fim de conter a disseminação da TB deve ser realizada a busca ativa dos sintomáticos respiratórios, e dos contatos dos mesmos.