

Trabalho apresentado no 15º CBCENF

Título: NECROSE PENIANA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Relatoria: ISABELLA STEFANE MAGALHAES MEDEIROS
ELAYNE MENDES DE OLIVEIRA
Autores: MARIA DE FATIMA DE CARVALHO MELLO
NATALIA LIMA SOUSA
HELICIO FONTELES TAVARES DA SILVA
Modalidade: Pôster
Área: Determinantes de vida e trabalho
Tipo: Relato de experiência
Resumo:

A isquemia é uma condição de interrupção no suprimento de oxigênio e nutrientes para uma determinada área, durante um período, devido a uma deficiência de fornecimento de sangue, o que pode acarretar a morte tecidual. A ocorrência de isquemia peniana é relativamente rara, especialmente quando se apresenta como única manifestação clínica. A sua etiologia é variada podendo ocorrer em casos de traumatismos, diabetes, insuficiência renal, infecções, neoplasias, fenômenos trombóticos e vasculites sistêmicas. Este trabalho tem como objetivo reconhecer a patologia, enfatizando suas manifestações clínicas e tratamento e Identificar os diagnósticos e intervenções de enfermagem relacionados a paciente. Trata-se de relato de experiência, com abordagem qualitativa, conforme Minayo (2008), o método qualitativo é aquele se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, sendo assim produto das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos. O estudo foi realizado através da internação de uma criança com 4 anos de idade em uma organização social gerida por recursos públicos com especialidade em clínica médica, localizada em Fortaleza-Ceará que chegou no hospital apresentando necrose peniana, onde foi realizado o debridamento cirúrgico. Fazia uso de albandazol, ceftriaxona, e plamet. Foram identificados os seguintes diagnósticos de enfermagem, de acordo com a taxonomia da NANDA: 1. Risco para infecção relacionado a procedimentos invasivos ou traumas, destruição dos tecidos, imunossupressão, leucopenia, doença crônica. 2. Excesso/déficit do volume de líquidos relacionados as falhas dos mecanismos reguladores. Perante uma lesão isquêmica da glândula impõe-se o diagnóstico diferencial com um variado número de patologias. Oclusivos alterações vasculares são um fator condicionante na maioria dos pacientes com necrose peniana. As características clínicas de necrose peniana incluem cicatrizes, mumificação, a auto-amputação, e superinfecção, de modo que o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são decisivos para a evolução desta doença.