

Trabalho apresentado no 15º CBCENF

Título: PROCESSO DE ENFERMAGEM APLICADO A UM PACIENTE ACOMETIDO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA

Relatoria: THAYNARA FERREIRA FILGUEIRAS
JEFFERSON GOMES DE ABREU

Autores: THIAGO FERREIRA FILGUEIRAS
MARIA BERENICE GOMES NASCIMENTO

Modalidade: Pôster

Área: Determinantes de vida e trabalho

Tipo: Relato de experiência

Resumo:

A trombose venosa profunda (TVP) é o desenvolvimento de um trombo (coágulo de sangue) dentro de um vaso sanguíneo venoso com conseqüente reação inflamatória do vaso, podendo, esse trombo, determinar obstrução venosa total ou parcial. A TVP é relativamente comum (50 casos/100.000 habitantes) e é responsável por sequelas de insuficiência venosa crônica: dor nas pernas, edema (inchaço) e úlceras de estase (feridas). Além disso, a TVP é também responsável por outra doença mais grave: a embolia pulmonar. O objetivo geral é aplicar o processo de enfermagem em um paciente com trombose venosa profunda. Trata-se de um relato de experiência realizado em novembro de 2010, durante as aulas práticas da disciplina Bases Teóricas, do Curso de Graduação da Universidade Federal de Campina Grande, Campus Cajazeiras, Paraíba, Brasil. Para nortear os cuidados utilizou-se o processo de enfermagem após assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Os relatos foram analisados de acordo com a literatura pertinente. Após a aplicação do processo de enfermagem evidenciou-se que o paciente de 55 anos foi admitido na clínica médica, ao exame céfalo-caudal foram levantadas as necessidades encontradas e encontrado os seguintes Diagnósticos de Enfermagem: Potencial para trauma relacionado á cama alta sem a proteção adequada. Risco para lesão da pele do MID relacionado à circulação alterada. Risco de queda brusca de temperatura nos MID relacionado à inatividade. Risco de desequilíbrio na temperatura corporal relacionado à doença que afeta a regulação da temperatura. Mobilidade do leito prejudicada relacionada ao leito sem grades. Mobilidade física prejudicada relacionada á repouso no leito ou imobilidade. Risco para lesão relacionado a o perfil sanguíneo anormal evidenciado pela T.V.P. Os cuidados de enfermagem aplicados foram: proteção do paciente contra queda, estimular mudança de decúbito deixando na posição de Trendelenburg, monitorização contínua dos SSVV, medir diariamente o membro afetado, avaliar a perfusão do membro afetado, ficar atento com sangramento e administrar a medicação prescrita. Conclui-se que é de suma importância para a formação discente, a aplicação do processo de enfermagem nas práticas hospitalares; além de viabilizar o cuidado integral ao paciente com risco para trombose.