

Trabalho apresentado no 15º CBCENF

Título: UMA ANÁLISE DOS FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O ABANDONO DO TRATAMENTO DE TUBERCULOSE

Relatoria: UMBELINA PORTO CONCEIÇÃO
MARA HELENA COSTA DE ANDRADE

Autores: PRISCILA FONTENELE BRITO
DANILA PACHECO DA SILVA
SENIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES

Modalidade: Pôster

Área: Determinantes de vida e trabalho

Tipo: Pesquisa

Resumo:

A Tuberculose é uma doença infecciosa que afeta principalmente o parênquima pulmonar podendo ser transmitida para outras regiões do corpo, incluindo as meninges, rins, ossos e linfonodos. O principal agente infeccioso, *Mycobacterium tuberculosis*, é um bastonete aeróbico ácido-resistente que cresce lentamente e é sensível ao calor e a luz ultravioleta. A TB é uma questão de saúde pública mundial, uma vez que é indicada como a principal causa de morte por doença infecciosa no mundo. A relevância deste tema situa-se no fato de que o portador de tuberculose que não adere à terapêutica continua doente e permanece como fonte de contágio. Este estudo tem como objetivo identificar os fatores que colaboram para o abandono do tratamento pelo portador de tuberculose. Trata-se de um estudo bibliográfico com abordagem descritiva de característica qualitativa, realizada através da análise de livros, revistas científicas e sites que abordavam sobre a temática, publicados no período de 2005 a 2010. A pesquisa foi realizada entre os períodos de agosto à novembro, tendo em vista aprimorar conhecimentos sobre quais motivos proporcionaram o abandono do tratamento. A TB está diretamente relacionada à pobreza, subnutrição, condições de aglomeração e condições precárias de cuidados de saúde. Além disso, a irregularidade do tratamento leva a desistência medicamentosa e à recidiva da doença, estabelecendo dificuldades ao processo de cura e aumentando o tempo e o custo do tratamento. Os fatores que contribuem para o abandono ao tratamento são: a não aceitação do diagnóstico, tabagismo, drogadição, efeitos colaterais das medicações, indisciplina, melhora nos sintomas, fatores socioeconômicos, falta de conhecimentos sobre a transmissão, a complexidade da doença e ainda dificuldade à adaptação do período preconizado para a eficaz conclusão do tratamento. Diante disso, o estudo das causas que levam esse paciente a abandonar o tratamento contribuirá para a adequação dos planos terapêuticos de enfermagem, visto que esta assistência é contínua interferindo de forma decisiva na busca de resultados positivos, obtendo assim uma terapêutica eficaz.