

## Trabalho apresentado no 15º CBCENF

**Título:** ABANDONO DE TRATAMENTO DA TUBERCULOSE: UM ESTUDO DE REVISÃO<sup>1</sup>

**Relatoria:** CARLA SUELLEN PIRES DE SOUSA

ALINE CRUZ ESMERALDO ÀFIO

CAMILA KARINNE GOMES ALBUQUERQUE

SARA CRISTINA SARAIVA B BATISTA

MAYENNE MYRCEA QUINTINO PEREIRA VALENTE

Modalidade: Pôster

**Área:** Vulnerabilidade social

**Tipo:** Pesquisa

Resumo:

Tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria denominada de Mycobacterium tuberculosis que afeta principalmente os pulmões, mas, também pode ocorrer em outros órgãos. É uma doença curável cujo tratamento dura seis meses. É considerado abandono de tratamento o paciente que após iniciado o tratamento para tuberculose, deixa de comparecer à unidade de saúde por mais de 30 dias depois da data aprazada para seu retorno ou que não completa o número de doses no prazo previsto. O abandono de tratamento é um obstáculo no progresso do combate a TB. Objetivou-se conhecer a produção científica sobre abandono de tratamento de tuberculose e esclarecer os principais motivos do abandono de tratamento. Tratou-se de estudo de revisão realizado nas bases de dados (Medline/Pubmed e Lilacs) em maio de 2011, foram utilizados os descritores, cessation, treatment e tuberculosis, para a busca na base internacional e abandono, tratamento e tuberculose para a busca na base de dados latino-americana. Foram selecionados e analisados 134 artigos. Após a leitura dos títulos e resumos e aplicação dos critérios de seleção foram elencados nove artigos para leitura. Evidenciaram-se em relação ao número de artigos publicados por ano, houve uma equivalência de publicação dessa temática nos anos de 2005 e 2007, com duas publicações em cada ano e apenas uma a mais em 2010, porém não houve continuidade na quantidade de publicação durante os anos. Tem-se que a maior parte dos artigos objetivava identificar os fatores mais frequentes que levam ao abandono em pacientes portadores de TB nas suas diversas peculiaridades. Durante a análise dos periódicos percebemos vários motivos que levaram o paciente a abandonar o tratamento da tuberculose, dentre eles, falta de vínculo entre paciente e profissional da saúde e com a própria unidade onde o paciente recebe o tratamento. É importante lembrar que os fatores são diferenciados quando associados ao paciente e quando associados ao serviço de saúde, sendo necessário buscar estratégias e intervenções para soluções destes problemas potenciais de saúde identificados para uma assistência de enfermagem mais condizente com as reais necessidades de nossos pacientes. Conclui-se que o abandono do tratamento de TB deve ser tratado pelos profissionais de saúde no seu contexto humanizado principalmente pela enfermagem que tem participação direta e ativa no desenvolvimento de melhorias no atendimento aos pacientes com tuberculose.