

Trabalho apresentado no 16º CBCENF

Título: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE TABAGISTA: RISCOS AO PROFISSIONAL DE PSIQUIATRIA

Relatoria: SANDRA MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO

Leila Maria Claudino Lage

Autores: DENISE BOTELHO PONTES

Marli Reinado Barbosa

CAMILA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS

Modalidade: Pôster

Área: Acessibilidade e sustentabilidade no SUS

Tipo: Pesquisa

Resumo:

Assistência De Enfermagem Ao Paciente Tabagista: Um Levantamento Dos Riscos Para Saúde Do Profissional Que Atua No Setor De Psiquiatria
Introdução: Frequentemente, estudos são realizados e divulgados no meio científico sobre os efeitos provocados pelo tabaco no organismo dos seres humanos, fumantes e não-fumante, este último, classificado como "fumante passivo". O paciente fumante em Unidade de Psiquiatria em sua grande maioria faz uso do fumo devido à ansiedade inerente à sua patologia. Assim a enfermagem que atua nas vinte e quatro horas na assistência ao doente ficam expostos ao com o resíduo de fumo utilizado pelo paciente, podendo ser prejudicial à saúde do profissional, onde se entende como fumante passivo. Fumante passivo é aquele que inalam uma fumaça ainda pior que a do fumante, por não ter passado pelo filtro do cigarro e expor-se a níveis três vezes mais altos de nicotina em seu organismo do que a que é aspirada pelo próprio fumante. A causa dessa dependência está nas mais de quatro mil substâncias tóxicas existentes no cigarro, incluindo a nicotina; e, dessas, oitenta são comprovadamente cancerígenas. Objetivo: Descrever quais os riscos para a saúde do profissional de enfermagem na assistência ao paciente psiquiátrico fumante. Metodologia: Revisão integrativa da Literatura; nas bases de dados LILACS, e BDNF do sítio da biblioteca Virtual em Saúde - BVS- BIREME desde 2001 até 2012. Critérios de inclusão: artigos Brasileiros e Internacionais, gratuito, na íntegra. Utilizou-se 21 artigos, obedecendo aos critérios de inclusão. Conclusão: O tabaco é fator de risco para câncer, doença pulmonar obstrutiva crônica e cardiovascular, desta forma o profissional de enfermagem como fumante passivo ao prestar assistência ao paciente psiquiátrico fumante, vincula-se diretamente a esses riscos. Consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Esses profissionais deverão prevenir-se dos efeitos nocivos do fumo a que se expõem como fumantes passivos. A fumaça de nicotina com 0,5 milimicras em seu meio, somente consegue ser filtrada através da Mascarã N95 que deverá ser o EPI de eleição nesses casos.