

Trabalho apresentado no 17º CBCENF

Título: A MAGNITUDE DA TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE BERURI-AM
Relatoria: ROSETE DAMIAO NUNES DA SILVA
Autores:
Modalidade: Pôster
Área: Força de trabalho da enfermagem: recurso vital para a saúde
Tipo: Monografia
Resumo:

INTRODUÇÃO: A Tuberculose (TB) é uma das doenças infectocontagiosas mais antigas do mundo e permanece até os dias atuais como um dos problemas mais relevantes de saúde pública. Apesar de Beruri, município do Estado do Amazonas, não se tratar de um município prioritário para o controle da doença, o fato do mesmo dispor de um atendimento direcionado aos pacientes suspeitos de tuberculose, com diagnóstico local, despertou o interesse em realizar um estudo voltado para desvelar a magnitude da Tuberculose nesse município. **OBJETIVO:** Analisar a magnitude da TB no município de Beruri-AM, nos últimos dez anos. **METODOLOGIA:** Tratou-se de um estudo documental retrospectivo e descritivo, com abordagem quantitativa, realizada com base nas informações colhidas em prontuários do paciente dos pacientes, ficha de notificação epidemiológica de TB e livros de registros de 62 (sessenta e dois) pacientes atendidos na UBS José Belarmino de Amorim, no Município de Beruri, nos últimos dez anos. **RESULTADOS:** A prevalência de Tuberculose nos últimos 10 (dez) anos no município foi de 3,92%. Destes, a maioria era do sexo masculino (54,84%) e o feminino ficando com (45,16%), faixa etária mais frequente foi entre 31 a 40 anos (30,65%) seguidos os maiores de 50 anos com (29,03%); casados (67,74%) e os solteiros com (27,42%); residentes na zona urbana (87,10%); agricultores (59,68%) e os que trabalham no lar com (22,58%); com ensino fundamental incompleto (58,06%) e 70,83% apresentavam histórico de tabagismo. A TB pulmonar foi à forma mais prevalente (93,55%), diagnosticada prioritariamente pelo exame laboratorial de baciloscopia de escarro (93,55%). Outro método de diagnóstico refere-se ao raio x, sendo diagnosticados como sugestivo de Tuberculose 54,84% dos casos. Dentre os sintomas mais frequentes, identificou-se tosse (96,77%), febre (98,39%), dor torácica (67,74%) e emagrecimento (62,90%). Uma minoria (37,10%) tinha histórico de vacinação BCG.No que se refere às comorbidades associadas, o tabagismo despontou com 70,83%. Constatou-se o surgimento de 72,52% casos novos e 20,97% de recidiva, durante o período estudado. Em relação à oportunidade de diagnóstico e tratamento, 38,71% foram diagnosticados após um mês da procura ao serviço e 20,97% iniciaram o tratamento após um mês do diagnóstico da doença. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a tuberculose no município de Beruri-Am apresenta-se como um relevante problema de saúde pública com oportunidade de diagnóstico e tratamento ainda deficientes.