

Trabalho apresentado no 17º CBCENF

Título: USO DO METRONIDAZOL NO CONTROLE DO ODOR DE FERIDAS TUMORAIS: UMA REVISAO INTEGRATIVA

Relatoria: BRUNA RIBEIRO DE ARAUJO LIRA

Autores: IRENE DA SILVA JESUS
CLARISSA PORFÍCIO MENDES

Modalidade: Pôster

Área: Força de trabalho da enfermagem: recurso vital para a saúde

Tipo: Pesquisa

Resumo:

O tema proposto para o estudo foi sobre o uso do Metronidazol no controle do odor de feridas neoplásicas, já que é um dos sintomas que mais afetam a qualidade de vida de seus portadores. Ao se promover uma redução do odor, dá-se a oportunidade ao paciente de sentir mais conforto, alívio, dignidade de tratamento, fazendo com que o mesmo sinta vontade de continuar colaborando com seus cuidados até o momento da morte. Contamos com alguns tipos de curativos que ajudam no controle do odor. Mas o método que tem grande eficácia e rápida ação conforme as observações do cotidiano é o uso do Metronidazol nos curativos, seja através de irrigação local ou aplicação de comprimidos macerados sobre o leito da ferida. A forma de utilização não é padronizada, mas a eficácia é constatada com poucos dias de uso. Portanto surgiu a necessidade de levantar dados a cerca do uso do Metronidazol no controle do odor de feridas tumorais. O objetivo deste estudo é realizar uma revisão integrativa sobre o uso do Metronidazol no controle do odor de feridas tumorais, promovendo dados para a melhoria da prática clínica do enfermeiro. Foi realizada uma revisão integrativa com a finalidade de reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre um delimitado tema ou questão, de maneira sistemática e ordenada. Os estudos selecionados estão baseados em relatos de experiência, práticas vividas no cotidiano da enfermagem, com pouca comprovação científica, o que demonstra carência de pesquisas de cunho experimental. No que se refere ao odor, surge o Metronidazol, um fármaco que age diretamente na gênese do mesmo, é utilizado não só de forma sistêmica, mas também durante a prática do curativo como técnica para reduzir o odor. Foi possível perceber através dos estudos que o medicamento trouxe ótimos resultados neste sentido. Portanto, fica claro o sucesso do Metronidazol no controle do odor e a necessidade de mais estudos para fortalecer esta técnica do enfermeiro, já que este profissional estando cada vez mais capacitado, poderá atuar com segurança, permitindo bem-estar e assistência de enfermagem adequada ao paciente portador de ferida neoplásica.