

## Trabalho apresentado no 17º CBCENF

**Título:** CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE ÚLCERA POR PRESSÃO EM PACIENTES HOSPITALIZADOS: REVISÃO DE LITERATURA

**Relatoria:** ALANA THIÈRE SILVA DE FRANÇA

**Autores:** Angélica Miranda Guerra  
Andrey Bastos Teixeira

**Modalidade:** Pôster

**Área:** Força de trabalho da enfermagem: recurso vital para a saúde

**Tipo:** Monografia

**Resumo:**

A úlcera por pressão é definida como lesões localizadas na pele, músculos e ossos, causados por pressão intensa ou contínua, levando à diminuição da circulação sanguínea e necrose. As principais áreas de ocorrências de UPP'S são as regiões de proeminências ósseas, que além de ocasionar dano tissular, podem provocar inúmeras complicações e agravar o estado clínico do paciente. Essas lesões levam a um maior tempo de internação, aumento do risco para a segurança orgânica e um custo elevado na hospitalização, representando um agravamento no bem estar físico e mental do paciente. O conhecimento e entendimento da definição, dos fatores desencadeantes e principalmente as medidas de prevenção são de extrema importância para que o processo preventivo do cuidado seja estabelecido de forma satisfatória e eficiente nos pacientes hospitalizados. O estudo tem como objetivo identificar os cuidados de enfermagem na prevenção de UPP'S durante a hospitalização, apresentar medidas preventivas e descrever seus fatores desencadeantes. Para realização deste estudo foi realizada uma revisão integrativa de literatura sobre o tema com delineamento quantitativo, onde foi feita a análise, confecção de tabelas e a classificação dos artigos dentro dos padrões metodológicos da qual a pesquisa se caracteriza, observando e julgando os resultados segundo as propostas dos objetivos desta revisão literária. O estudo demonstrou que o ano de 2007 apresentou 10 artigos (18,86%) do número total de artigos estudados, foi o ano que ocorreu o maior número de publicações científicas a respeito da prevenção de UPP'S; observou-se que a sensibilidade superficial diminuída e a mobilidade física prejudicada representam os fatores desencadeantes mais abordados pelos pesquisadores, representando 42 artigos (79,24%) do total de artigos pesquisados. Em relação às medidas preventivas mais abordadas, evidenciou-se que a mudança de decúbito representa a principal medida preventiva, com 45 artigos (84,90%) do total de publicações pesquisadas e em segundo lugar evidenciou-se a utilização do colchão piramidal com 40 artigos (75,47%). Conclui-se que para prestar uma SAE de forma integral e com qualidade devem-se considerar vários fatores que levam a ocorrência de UPP'S, não dependendo apenas dos cuidados prestados pela enfermagem, mas também identificando os fatores que interagem entre si, dentre os quais estão relacionados aos pacientes e à própria instituição como provedora de condições para prestação de cuidados.