

Trabalho apresentado no 17º CBCENF

Título: PRINCIPAIS AFECÇÕES GINECOLÓGICAS DETECTADAS NO EXAME DE PCCU EM UMA ESF DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU/PA

Relatoria: CAMILLA BARROS DE MENEZES

Autores:

Modalidade: Pôster

Área: Força de trabalho da enfermagem: recurso vital para a saúde

Tipo: Relato de experiência

Resumo:

Introdução: O PCCU é uma importante ferramenta do Ministério da Saúde para detectar, além de neoplasias, outras afecções que podem acometer mulheres de diferentes faixas etárias. Atualmente, observamos algumas dificuldades no que se diz respeito à realização e procura do exame, que envolve fatores sociais, econômicos e culturais. Objetivo: Identificar os principais diagnósticos obtidos através do exame de PCCU em uma ESF do Município de Tomé-Açu/PA. Metodologia: O estudo realizado foi do tipo exploratório, com abordagem quantitativa realizado em uma ESF localizada no bairro da Forquilha, no município de Tomé-Açu/PA. As amostras utilizadas foram os resultados de citologias obtidos no período de Fevereiro/2013 a Fevereiro/2014. Os dados foram analisados e coletados nos meses Abril e Maio/2014, sendo utilizado como instrumento de coleta de dados o Livro de Registros dos Resultados de PCCU e a Planilha de Resultados de exame de PCCU da ESF em questão. É importante ressaltar que a pesquisa está de acordo com a Resolução Nº196/96 de 10 de outubro de 1996, da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa – CONEP. Análise dos Resultados: No período avaliado foi observado que a maioria dos resultados se deu a DST ou por mudança da flora vaginal (86,5%). A faixa etária em que mais se realizou o exame foi de 21 - 59 anos de idade (72,6%), seguido das mulheres de 14 - 24 anos (24,4%) e por fim as de 60 anos ou mais (3%). A Cándida albicans foi diagnosticada em 44,4% dos exames avaliados, sendo uma das principais responsáveis pelas queixas relatadas nos consultórios. O percentual de processo inflamatório por agentes não identificados caracterizados por alterações epiteliais e celulares foi de 18%. A Gardnerella vaginalis foi detectada em 16,8% dos resultados, podendo ser observada na flora vaginal de mulheres sexualmente ativas. Para esfregaço citolítico e Lactobacilos sp foi apresentado um percentual de 2,8%. Apenas 1,7% dos resultados apresentaram Trichomonas vaginalis e a porcentagem de exames normais foi de 12,9%. Conclusão: A partir da análise dos dados, podemos verificar que as afecções mais frequentes encontradas foram a Candidíase, seguida de Gardnerella e Processo Inflamatório, mostrando que o exame preventivo, também pode ser considerado válido para o rastreamento das principais doenças sexualmente transmissíveis, fazendo com as mesmas tenham um diagnóstico precoce, possibilitando um tratamento viável e eficaz quando realizado corretamente.