

## Trabalho apresentado no 18º CBCENF

**Título:** PROPOSTA DE PLANO DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM UTILIZANDO A CIPE® PARA PESSOAS COM LEISHMANIOSE

**Relatoria:** IVANA DE ARAUJO FONSECA  
Richardson Augusto Rosendo da Silva

**Autores:** Vinicius Lino de Souza Neto  
Barbara Coeli Oliveira da Silva

**Modalidade:** Pôster

**Área:** Gestão, tecnologias e cuidado

**Tipo:** Pesquisa

**Resumo:**

Introdução: A Leishmaniose Visceral (LV) é uma enfermidade crônica, sistêmica, grave e potencialmente fatal para o homem. A sua letalidade pode alcançar 10% caso não seja instituindo o tratamento adequado. É caracterizada como uma doença zoonótica de transmissão vertical, sendo considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um grande problema de saúde pública, decorrente da sua complexidade clínica e epidemiológicas. Objetivo: propor um plano de cuidados com os respectivos diagnósticos, intervenções e resultados utilizando a CIPE ao paciente com leishmaniose visceral. Metodologia: Estudo do tipo relato de caso, realizado em uma unidade de infectologia de um Hospital Escola no Nordeste do Brasil. Antes de iniciar a coleta de dados o projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, CAAE Nº 21420813.2.0000.5182. Assim, os dados foram coletados em fevereiro de 2014 por meio de um instrumento de anamnese e exame físico. Posteriormente procedera-se a análise de forma processual a partir das fases do processo de julgamento clínico de Gordon. Utilizou-se a CIPE®2.0 como banco terminológico para a construção dos diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem, seguindo os preceitos estabelecidos pelo Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN). Resultados: Após a análise dos dados, elencou-se 36 afirmativas de diagnósticos de enfermagem, apresentando com maior prevalência: ingestão de alimento prejudicada, caquexia, eliminação vesical espontânea comprometida, higiene da cavidade oral prejudicada, exposição à contaminação, ritmo cardíaco acentuado, insônia, abuso de drogas, abuso de álcool e tabaco, isolamento social, aceitação e medo. Logo em seguida foi elencado para cada diagnóstico 05 intervenções e 12 resultados esperados. Infere-se que os pacientes avaliados apresentam dentro das necessidades humanas básicas, alterações psicossociais, aos quais remete cuidados específicos. Conclusão: pôr fim nota-se que o plano de cuidados proporciona ao enfermeiro da prática a direcionar-se as necessidades prioritária para pacientes com AIDS.