

## Trabalho apresentado no 18º CBCENF

**Título:** RELATO DE EXPERIÊNCIA: INFLUÊNCIA DO PARTO SOBRE O DESMAME NO PUERPÉRIO

**Relatoria:** GLECIANE COSTA DE SOUSA

Francilene de Sousa Vieira

**Autores:** Ederson dos Santos Costa

Débora Éllen Pinheiro Oliveira

Maria de Jesus Lopes Mousinho Neiva

**Modalidade:** Pôster

**Área:** Educação, política e vulnerabilidade social

**Tipo:** Relato de experiência

**Resumo:**

Introdução: O ato de amamentar sofre diversas interferências que vêm a acarretar inúmeros prejuízos à saúde da mãe e do lactente. Dentre os fatores o tipo de parto pode vir a influenciar quanto à essa decisão. Objetivo: Identificar os fatores condicionantes do desmame precoce relacionados ao parto. Metodologia: Este trabalho trata-se de um relato de experiência, realizado nos meses de janeiro à março de 2014. Após o consentimento da instituição procedeu-se a coleta dos dados das puérperas que deveriam preencher aos seguintes critérios de inclusão: morar na cidade de Caxias, ser mãe de criança que esteja com até dois meses de vida, ser maior de 18 anos. Procedendo a etapa seguinte que consistiu na apresentação das atividades a serem desenvolvidas com as puérperas selecionadas. O terceiro passo constituiu-se na aplicação de entrevista individual para obtenção dos dados biográficos e demográficos, bem como para avaliar o nível de compreensão das mesmas sobre o tema abordado. Resultados: Após a realização das entrevistas, passou-se a análise dos dados, os quais foram agrupados em categorias de modo a permitir uma maior compreensão a cerca dos resultados obtidos. Em um primeiro momento foi realizado a caracterização das participantes. Preencheram aos critérios de inclusão 158 puérperas. No entanto fizeram parte do estudo apenas 93, onde 43 puérperas não foram encontradas, 19 mudaram-se, 01 não aceitou, 02 recém-nascidos faleceram. A faixa etária predominante foi dos 25 aos 30 anos seguida pela de 18 a 20 anos. Sendo a maioria da cor parda, solteira e católica com ensino médio completo, dona de casa. Quanto aos antecedentes obstétricos, a maioria eram múltíparas, com predominância de puérperas que realizaram o pré-natal. O principal fator relacionado ao desmame no puerpério associado ao tipo de parto foi o desconforto pós-parto advindo de cesariana. As participantes atribuem ao parto normal como o melhor, devido sua rápida recuperação possibilitando a proximidade tão logo quanto possível com a criança. Considerações finais: A realização desse estudo permitiu identificar algumas variáveis que estão relacionadas com a prática do desmame no puerpério associadas ao tipo de parto, dentre elas destaca-se o desconforto pós-parto. Verificou-se ainda mediante o trabalho desenvolvido a escassez de informação das puérperas sobre aleitamento materno, sendo condicionadas ao senso comum o que influencia diretamente a prática da amamentação.