

Trabalho apresentado no 18º CBCENF

Título: CHIKUNGUNYA E SUAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
Relatoria: JOSEFA PEREIRA GOMES
AGNA ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA
Autores: AMANDA SILVA RODRIGUES
ROSIMERE PINTO DOS SANTOS
CRISLAYNNE ALVES DOS SANTOS
Modalidade: Pôster
Área: Gestão, tecnologias e cuidado
Tipo: Pesquisa
Resumo:

A Febre Chikungunya pode ser transmitida pelos mosquitos *Aedes aegypti* e *albopictus*. O nome Chikungunya significa 'aquele que se curva' na língua Makonde, razão da posição antálgica que os pacientes adquiriam durante o período da doença. Os sinais e sintomas são clinicamente semelhantes aos da dengue, com febre de início agudo, dores articulares e musculares, cefaleia, náusea, fadiga e exantema. A principal manifestação clínica que a difere da dengue são as fortes dores nas articulações. O estudo objetiva apresentar as manifestações clínicas da Febre Chikungunya e caracterizá-la nas suas fases aguda, subaguda e crônica. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, onde foi realizada uma revisão sistemática e integrativa de literatura, na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Na inserção do descritor Chikungunya obteve-se 2.275 resultados, utilizando como critério de seleção idioma português, resultou em 05 trabalhos. Também foram utilizados manuais e informes técnicos lançados pelo Ministério da Saúde. A pesquisa realizou-se entre os meses de março a julho de 2015. Essa doença após o período de incubação pode evoluir em três fases: aguda, subaguda e crônica. A primeira é caracterizada principalmente por febre de início súbito e surgimento de intensa artralgia, febre elevada de início abrupto, poliartralgia, dor nas costas, cefaleia e fadiga. Na segunda fase a febre desaparece, podendo haver persistência ou agravamento da artralgia, incluindo poliartrite distal, exacerbação da dor articular nas regiões previamente acometidas na primeira fase e tenossinovite hipertrófica subaguda em punhos e tornozelos, astenia, prurido generalizado e exantema maculopapular, em tronco, membros e região palmo-plantar, lesões purpúricas, vesiculares e bolhosas. Já na crônica o sintoma mais comum é o acometimento articular persistente nas articulações atingidas durante a fase aguda, caracterizado por dor com ou sem edema, limitação de movimento, deformidade e ausência de eritema. Normalmente o acometimento é poliarticular e simétrico. A Chikungunya é uma doença febril cuja característica clínica mais importante e debilitante é a artralgia. Como em alguns casos podem evoluir para a fase crônica a equipe de saúde precisa estar atenta para as doenças de base preexistentes a fim de diminuir danos e orientar à pessoa nessa fase quanto a necessidade de acompanhamento em longo prazo.