

## Trabalho apresentado no 18º CBCENF

**Título:** VERSÃO TECNOLÓGICA PARA RASTREAR SINTOMAS DE TRANSTORNO DA COMPULSÃO ALIMENTAR PERIÓDICA EM ADOLESCENTES

**Relatoria:** TÚLIO PAULO ALVES DA SILVA  
Flavia Maria Nassar de Vasconcelos

**Autores:** Rosana Christine Cavalcanti Ximenes  
Rodrigo César Aves de Lima  
Juliana Lourenço de Araújo Veras

**Modalidade:** Comunicação coordenada

**Área:** Gestão, tecnologias e cuidado

**Tipo:** Pesquisa

**Resumo:**

O Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica (TCAP) caracteriza-se pela ingestão de grande quantidade de alimento em duas horas, ocorrendo em pelo menos dois dias por semana durante seis meses, associado à perda de controle alimentar, angústia e não deve estar acompanhado de comportamentos compensatórios para o controle de peso (APA, 2000; AZEVEDO, SANTOS, FONSECA, 2004). O presente estudo tem como objetivo averiguar a aplicabilidade da escala QEWP-A usada para verificar os sintomas de compulsão alimentar em adolescentes. **Materiais e Métodos:** O presente estudo transversal foi realizado em uma escola estadual da cidade de Vitória de Sato Antão - PE. A amostra foi composta por 53 adolescentes com idade entre 10 e 19 anos, matriculados na rede pública de ensino. Os dados referentes ao transtorno alimentar de cada participante da pesquisa, foram obtidos pelo pesquisador através da utilização de questionário específico Questionnaire of Eating And Weight Patterns Adolescent (QEWP-A). **Resultados:** Dos 53 pacientes analisados, 17 (32,1%) eram do sexo masculino e 36 (67,9%) eram no sexo feminino. Para o diagnóstico sintomático do Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica (TCAP), Bulimia Nervosa não-purgativa e Bulimia Nervosa purgativa, o questionário Questionnaire of Eating And Weight Patterns - Adolescent (QEWP-A) aplicado mostrou que houve, na amostra, quatro casos encontrados; sendo todos do sexo masculino, representando 23,52% dessa subamostra. **Conclusão:** Diante do exposto no presente estudo, pode-se concluir que a aplicação da escala QEWP-A para a avaliação de sintomas da compulsão alimentar em adolescentes é eficaz.