

## Trabalho apresentado no 18º CBCENF

**Título:** TENDÊNCIA DE MORTALIDADE POR TUBERCULOSE EM IDOSOS ENTRE 2003 E 2013 NO BRASIL

**Relatoria:** MARIA JOYCE TAVARES ALVES

Cláudia Jeane Lopes Pimenta

**Autores:** Thiago Lívio Barbosa

Eliane de Sousa Leite

Iluska Pinto Costa

**Modalidade:** Comunicação coordenada

**Área:** Educação, política e vulnerabilidade social

**Tipo:** Pesquisa

**Resumo:**

Introdução: a tuberculose é uma doença infecciosa de grandes proporções mundiais, apresentando uma grande prevalência em países pobres e em desenvolvimento. Nesse contexto, o Brasil apresenta uma alta taxa de infecções por tuberculose em todo o país e uma alta taxa de mortalidade em todas as faixas etárias, sobretudo na população idosa, onde, somente no ano de 2013, obteve um total de 1.762 óbitos. Diante disso, faz-se necessário pesquisar a taxa de mortalidade por tuberculose em indivíduos idosos e o perfil epidemiológico desses indivíduos. Objetivo: conhecer a tendência de mortalidade por Tuberculose em idosos no Brasil no período de 2003 a 2013. Metodologia: trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo com abordagem quantitativa, onde foram utilizados dados contidos na página do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde/Sistema de Informação sobre Mortalidade (DATASUS/SIM) acerca dos casos registrados de óbitos causados por Tuberculose no Brasil entre 1º de janeiro de 2003 e 31 de dezembro de 2013, utilizando-se as seguintes variáveis: Região, Sexo, Faixa etária, Raça/Cor, Escolaridade e Estado civil. Resultados: mediante a análise dos dados obtidos, foi identificado um total de 19.616 casos de óbitos por tuberculose em idosos no Brasil, sendo a maior parte registrada na Região Sudeste (8.060 casos). Observou-se que o perfil epidemiológico brasileiro da mortalidade em idosos por tuberculose é composto por homens (14.044 casos), com idade variando entre 60 e 69 anos (8.493 casos), com estado civil solteiro (4.711 casos), raça/cor branca (7.973 casos) e nenhuma escolaridade (4.728 casos). Conclusão: mediante a análise dos dados foi possível identificar uma alta taxa de mortalidade por tuberculose em indivíduos idosos entre os anos de 2003 e 2013, o que evidencia a necessidade de se investigar os fatores relacionados de forma direta e indireta com a infecção pelo bacilo da tuberculose na população idosa e sob quais características esses casos resultaram em óbitos, o que proporcionará o desenvolvimento de novas ações e estratégias para a prevenção da doença nesse estrato populacional.