

## Trabalho apresentado no 19º CBCENF

PERFIL E INCIDENCIA DE HANSENÍASE NOS ANOS DE 2015 E 2016 NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO

Título: ARAGUAIA - PARÁ

Relatoria: RAFAEL FREIRE DA SILVA

Camila Carvalho do Vale

**Autores:** Gracileide Maia Correa

Priscilla Rodrigues caminha Carneiro

Modalidade: Pôster

**Área:** Educação, Gestão e Política

**Tipo:** Pesquisa

Resumo:

Introdução: A hanseníase é uma doença crônica granulomatosa e infecciosa, transmitida por via respiratória superior pela pessoa que tem o Mycobacterium leprae, um bacilo álcool-ácido resistente, intracelular obrigatório, a única espécie de micobactéria que infecta nervos periféricos, especificamente as células de Schwann (ARAUJO, 2003). Manifesta-se principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos: lesões na pele e nos nervos periféricos (BRASIL, 2002). A pesquisa teve por objetivo realizar uma análise quantitativa e comparativa dos casos e investigar quais são os diagnósticos mais incidentes de Hanseníase nos anos de 2015 e 2016 no município de Conceição do Araguaia-PA. Metodologia: A pesquisa é de cunho quantitativo-descritivo e transversal, realizado no município de Conceição do Araguaia - PA no período de 2015 até o mês de maio de 2016. Os dados foram oriundos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação-SINAN por meio do Tabnet, não havendo manipulação e identificação dos pacientes. Os valores foram expressos em números absolutos e em percentual e posteriormente realizada a análise entre o número de casos a incidência e a forma clínica. Resultados: Foram analisados os casos de Hanseníase Paucibacilar e Multibacilar em 11 PSFs (Programa de Saúde da Família). Todos PSFs apresentaram casos de hanseníase no ano de 2015, no ano de 2016 até o mês de maio, 6 PSFs a relataram. Houve 17 casos Paucibacilar no ano de 2015, o PSF número 07 com 4 casos e no mês de março apresentou a maior incidência do ano. De janeiro até o mês de maio de 2016, três PSFs apresentaram casos de hanseníase Paucibacilar com 1 caso por mês e 4 durante todo o período. Em 2015, 19 casos durante o ano de Hanseníase Multibacilar. O PSF número 1 e PSF número 02 apresentaram maior incidência no ano. No ano de 2016, até o mês de maio, cinco PSFs relataram hanseníase multibacilar, com 13 casos. Conclusão: Percebeu-se que existe uma maior incidência de casos de hanseníase nos bairros mais carentes da cidade, portanto as ações preventivas e acompanhamento mensal dos pacientes diagnosticados com hanseníase, tem um papel primordial para o controle, necessário que tanto as ações quanto as notificações sejam realizadas de forma rigorosa no processo de acompanhamento dos casos, prevenção da doença e promoção de saúde para a população do município.