

## Trabalho apresentado no 19º CBCENF

**Título:** IDENTIFICAÇÃO DO RISCO AO LACTENTE NO USO DE MEDICAMENTOS DURANTE A AMAMENTAÇÃO  
**Relatoria:** JOÃO JOADSON DUARTE TEIXEIRA  
INGRID KEROLLY ALMEIDA DIAS  
**Autores:** JULIANE KERLY SILVA MARTINS  
MÔNICA OLIVEIRA DA SILVA ORIÁ  
REBECA SILVEIRA ROCHA  
**Modalidade:** Pôster  
**Área:** Inovação, Tecnologia e Cuidado  
**Tipo:** Pesquisa  
**Resumo:**

O uso de medicamentos/drogas pela mulher durante a amamentação é uma prática bastante frequente, sendo essa prescrição alvo de críticas haja vista a avaliação do risco-benefício, ou seja, devem ser levados em consideração aspectos que incluem os benefícios da amamentação, o impacto dos sintomas e da doença sobre a saúde materna, bem como as consequências para o recém-nascido. Nesse sentido, ainda são poucos os estudos recentes que estimam o consumo de drogas e avaliam os riscos aos quais os bebês que são amamentados por mães que utilizam drogas estão expostos. Portanto, surge a necessidade de atualizações constantes sobre o uso de medicamentos durante a amamentação, visando racionalizar esse uso e proteger o aleitamento materno. Dessa forma, este estudo objetivou identificar o risco ao lactente do uso de medicamentos na amamentação. Tratou-se de um estudo descritivo e quantitativo, realizado com 130 nutrizes de uma Unidade Básica de Saúde. Os dados foram coletados por meio de um formulário, no período de outubro a novembro de 2015, obedecendo os preceitos éticos da pesquisa com seres humanos, conforme a Resolução Nº 466/12 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde. A maior parte das lactantes que consumiram medicamentos tinha entre 21 e 25 anos (n=20; 29,85%), era casada (n=37; 52,22%), raça parda (n=44; 65,67%), boa escolaridade (9 a 14 anos de estudo) (n=52; 77,61%), do lar (n=34; 50,75%). Em sua maioria, não planejaram a gestação (n=42; 62,69%), realizaram pré-natal adequado (> ou = 6 consultas) (n=52; 77,61%) e tiveram parto cesárea (n=38; 56,72%). A maioria dos medicamentos consumidos pelas lactantes era de uso compatível com a amamentação (71; 97,53%), exceto o Fenobarbital (n=1; 1,37%) e o Losartana (n=1; 1,37%). Concluiu-se que os profissionais de saúde devem orientar as nutrizes a evitar o uso de medicamentos ou fazer opção por uma droga com comprovação clínica de que seja pouco excretada no leite materno, ou que não tenha risco aparente para a saúde do lactente. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria da Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias / Ministério da Saúde, Secretaria da Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. - 2. ed. - Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2010 - CHAVES, R. G.; LAMOUNIER, J. A.; CÉSAR, C. C. Factors associated with duration of breastfeeding. *Jornal de Pediatria*, v. 83, n.3, 2007.