

## Trabalho apresentado no 19º CBCENF

**Título:** MODO DE DETECÇÃO DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DE 2005 A 2015 EM RONDONÓPOLIS-MT  
**Relatoria:** LUAN SUDÁRIO MELO  
Débora Aparecida da Silva Santos  
**Autores:** Laura Bordignon Spessatto  
Naira Rúbia S. Ribeiro  
Camila Aoki Reinas Puntim  
**Modalidade:** Pôster  
**Área:** Inovação, Tecnologia e Cuidado  
**Tipo:** Pesquisa  
**Resumo:**

**Introdução:** A hanseníase é uma das primeiras enfermidades que atingiram a humanidade. É uma doença infecciosa crônica, causada pelo bacilo *Mycobacterium leprae*. O modo de detecção se dá por meio da demanda espontânea, encaminhamentos, exame de coletividade, exames de contato e por outros modos. **Objetivos:** Analisar o modo de detecção dos casos novos de hanseníase nos últimos 10 anos em Rondonópolis-MT, no período de 2005 a 2015. **Metodologia:** Estudo do tipo epidemiológico, transversal, descritivo, com abordagem quantitativa. A fonte de dados utilizada foi por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN, disponibilizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis (MT), incluindo os dados do modo de detecção de casos novos de hanseníase relativos a janeiro de 2005 a dezembro de 2015. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE 54226316.1.0000.5541). Foi realizada análise exploratória descritiva dos dados, a partir da apuração de frequências simples absolutas e percentuais para a variável categórica e organização dos resultados em gráfico. **Resultados:** Entre janeiro de 2005 a dezembro de 2015 a prevalência de hanseníase em Rondonópolis foi 1.922 casos, dos casos novos notificados no período do estudo, os modos de detecção mais prevalentes foram através da demanda espontânea e encaminhamentos com 834 (43,39%) e 784 (40,79%) respectivamente. Foram registrados 160 (8,32%) casos através do exame de coletividade e 131 (6,82%) pelo exame de contato enquanto 6 (0,31%) foram por outros modos de detecção e 7 (0,36%) foram ignorados. **Conclusão:** O modo de detecção predominante em Rondonópolis-MT foi à demanda espontânea seguido do encaminhamento. A proporção de detecção através da demanda espontânea significou uma resposta da população às campanhas de esclarecimento sobre a hanseníase neste município. As ações de educação em saúde são indispensáveis para o conhecimento da população, assim como ações efetivas devem ser realizadas pela equipe interdisciplinar em saúde, a fim de que a hanseníase seja detectada precocemente. **Referências:** BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de vigilância em saúde. Departamento de vigilância das doenças transmissíveis. Coordenação geral de hanseníase e doenças em eliminação. Informe Técnico: Campanha Nacional de Hanseníase, Verminoses, Tracoma e Esquistossomose 2015. Brasília, 2012.