Trabalho apresentado no 20º CBCENF

Título: DISFUNÇÕES SEXUAIS FEMININAS: QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA AVALIAÇÃO INICIAL NO CLIMATÉRIO

Relatoria: TAINAR MACIEL TRAJANO MAIA

Autores: Maria Lorena Santana Matos
Maria Hozana Santos Silva
Naiane Regina Oliveira Goes Reis
Marlizete Maldonado Vargas
Cláudia Moura Melo

Modalidade: Comunicação coordenada

Área: Cuidado, Tecnologia e Inovação

Tipo: Pesquisa

Resumo:

A sexualidade é um dos pilares do envelhecimento sadio e com qualidade de vida, é fundamental saber o que pode interferir na vida sexual da mulher durante esta etapa. O objetivo foi avaliar a função sexual em mulheres de 40-60 anos nas Unidades Referência no município de Aracaju/SE. Trata-se de um estudo exploratório descritivo com aplicação do Female Sexual Function Index (FSFI), que compreendeu 80 mulheres, entre 40-60 anos, cadastradas na Unidade Referência em Saúde da Mulher Francisco Fonseca, no bairro Santo Antonio, município de Aracaju/SE. O FSFI avalia as dimensões-chave da função sexual na mulher, nas últimas quatro semanas. Possui 19 questões sobre 6 domínios da resposta sexual: desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor, obtendo-se pontuação em que quanto maior a pontuação, menor o risco de disfunção sexual para determinado domínio. Previamente aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Tiradentes de Aracaju (UNIT) em 2016, sob o parecer nº1.813.269. A média da idade das mulheres na menopausa foi de 54,61 e da pré-menopausa foi de 47,33. Na categoria desejo as mulheres na menopausa obtiveram média de 2,43, excitação foi 1,11, lubrificação média de 1,11, orgasmo de 1,06, satisfação de 1,23 e dor a média foi de 1,40, enquanto as mulheres na pré-menopausa à média do desejo foi 3,51, excitação média de 3,26, lubrificação foi 3,78, orgasmo de 3,60, satisfação a média foi 3,83 e dor obteve 4,02. Ao analisar os valores totais as mulheres na menopausa obtiveram média de 8,34, já as na pré-menopausa a média foi de 22,0. A partir da análise realizada, foi possível observar que a média de todos os domínios, inclusive o total, foi maior nas mulheres que estão no período da pré-menopausa, podendo significar que as mulheres nesse período ainda não sofrem tanto com o impacto dos sintomas do climatério. Com isso, a maioria tende a não fazer parte das mulheres com disfunção sexual por obterem uma pontuação alta no valor total dos domínios. Mas, a partir da média da idade das mulheres na menopausa, observa-se que há alta incidência de disfunção sexual na faixa etária que essas mulheres se encontram. Pode-se concluir que houve alta prevalência de disfunção sexual entre as mulheres participantes, ainda, que consideradas apenas as mulheres sexualmente ativas, a prevalência continua alta e esses resultados assemelham-se aos encontrados na literatura.