

Trabalho apresentado no 20º CBCENF

Título: USO DA BOTA DE UNNA PARA O TRATAMENTO DE ÚLCERA VENOSA CRÔNICA EM PACIENTE FALCÊMICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Relatoria: KATYUCIA OLIVEIRA CRISPIM DE SOUZA

Autores: MAIANA EVILLYN DA SILVA SANTOS

Modalidade: Pôster

Área: Cuidado, Tecnologia e Inovação

Tipo: Relato de experiência

Resumo:

Introdução: As úlceras venosas crônicas (UVC) são complicações frequentes em indivíduos com anemia falciforme e estão relacionadas a fatores como a insuficiência venosa (IV), vaso oclusão, e genética.¹ O uso do curativo compressivo inelástico do tipo bota de unna minimiza os efeitos da IV agindo na macrocirculação, aumentando o retorno venoso e como consequência contribuindo efetivamente para cicatrização.² Objetivos: Descrever a experiência vivenciada em um ambulatório de cicatrização com o uso da bota de unna como tratamento de úlceras venosas crônicas em um paciente portador de anemia falciforme. Metodologia: Relato de experiência acerca da utilização da bota de unna como tratamento de úlceras venosas crônicas em um paciente portador de anemia falciforme de maio a julho de 2017 acompanhado no ambulatório de cicatrização do Hospital Universitário (HU) de Sergipe. Resultados: O paciente falcêmico com UVC foi acompanhado no ambulatório durante 10 semanas com a troca da bota de unna a cada 7 dias. Possuía UVC há mais de 10 anos nos maléolos internos de ambos os membros inferiores. A cada semana notou-se a redução de edema, melhora geral do aspecto das lesões e diminuição da exsudação. No dia 10/05/2017 a lesão em maléolo direito (MD) media 4,0 X 3,5 cm (comprimento por largura) e lesão em maléolo esquerdo (ME) media 6,5 X 2,0 cm, ambas rasas, com esfacelo denso e aderido, fétidas e com bastante exsudato amarelado. No dia 12/07/2017 a lesão em MD media 2,0 X 1,2 cm com fina camada de esfacelo não aderido, bordas com mais de 2 cm epitelizadas, sem odor fétido e sem exsudato e lesão em ME media 2,0 X 0,5 cm, toda granulada, pele perilesão epitelizada, sem odor e sem exsudato Conclusão: O uso da terapia compressiva com a bota de unna no paciente falcêmico com UVC mostrou-se satisfatória; a aplicação da mesma levou a uma redução do edema dos membros inferiores e uma melhor cicatrização das lesões. Referências: 1-BORGES, E.L. et al. Prevenção de recidiva de úlcera varicosa: um estudo de coorte. Acta Paul Enferm, São Paulo,v. 29, n.1, jan.2016. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ape/v29n1/1982-0194-ape-29-01-0009.pdf> >. Acesso em: 14 jul. 2017. BELCZAK, S.Q. et. al. 2-Tratamento da úlcera varicosa dos membros inferiores mediante cirurgia e bota de Unna: uma economia para o sistema de saúde brasileiro. Einstein, São Paulo, v. 9, n.3, p. 377-85, 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/eins/v9n3/pt_1679-4508-eins-9-3-0377.pdf >. Acesso em: 14 jul.2017.