

## Trabalho apresentado no 21º CBCENF

**Título:** ALEITAMENTO MATERNO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM CRUZEIRO DO SUL NO ACRE

**Relatoria:** MARIA ELIANA RODRIGUES DA SILVA

Tessa Jennifer Negreiros de Souza

Andrei Bandeira Rosas

Vanizia Barbosa da Silva Maciel

**Autores:** Raquel da Rocha Paiva Maia

Kleynianne Medeiros de Mendonça Costa

Érika de Sá Vieira Abuchaim

Ana Cristina Freitas de Vilhena Abrão

**Modalidade:** Pôster

**Área:** Políticas Públicas, Educação e Gestão

**Tipo:** Pesquisa

**Resumo:**

**Introdução:** Os benefícios do aleitamento materno para a criança são comprovados cientificamente, já que o leite humano tem em sua composição uma combinação de inúmeros nutrientes que juntos formam uma crucial fonte dietética no combate a morbimortalidade infantil. **Objetivo:** Descrever indicadores do aleitamento materno em uma Unidade Básica de Saúde em Cruzeiro do Sul no Acre. **Método:** Estudo transversal realizado durante Campanhas Nacional de Vacinação em 2016 e 2017 na Unidade Básica de Saúde Avenida 25 de Agosto. Os dados foram coletados por meio de um instrumento de pesquisa com as mães ou acompanhantes das crianças de 6 a 23 meses. A amostragem foi com base na Campanha Nacional de vacinação de poliomielite de 2015. Os resultados foram interpretados conforme os parâmetros da OMS. É importante destacar que esta pesquisa faz parte de um projeto maior de doutorado da docente Vanízia Barbosa Maciel denominado "Aleitamento Materno e Alimentação complementar de crianças no Estado do Acre" **Resultados:** Foram entrevistados 143 participantes, destes 128 (89,51%) eram mães com média de idade de 26,6 anos (DP 6,6). Das crianças, cerca de 98,44% mamaram alguma vez na vida e destas 86,51% mamaram na primeira hora de vida. O AME foi praticado por 36 % com média do desmame precoce de 3,7 meses (DP 2,4) min. 03 e Max. 09 meses. Estavam em aleitamento materno 57,34 % das crianças com média do desmame total de 7,2 meses (DP 4,4) Min. 01 e Max. 17 meses. Os motivos mais alegados para o desmame foram: O bebê não quis mais mamar 44,26%, seguido de 11,48% pouco leite/ leite secou. **Conclusão:** Baseado nestes dados, o Aleitamento na 1ª hora de vida classifica-se como bom, do AME como ruim e a média do desmame como muito ruim. Portanto, são necessárias intervenções na Unidade Básica de Avenida 25 de Agosto para melhoria do aleitamento materno.