

Trabalho apresentado no 22º CBCENF

Título: O USO DA TERAPIA DE REIDRATAÇÃO ORAL NO TRATAMENTO DA DIARREIA INFANTIL

Relatoria: Jallyne Colares Bezerra
Aynoan de Sousa Amaro
Maria Jocelane Nascimento da Silva
Hévila Ferreira Gomes Medeiros Braga

Autores: Brena Shellem Bessa de Oliveira
Rhaiany Kelly Lopes de Oliveira
Edmara Chaves Costa
Emanuella Silva Joventino Melo

Modalidade: Pôster

Área: Tecnologias, Pesquisa, Cuidado e Cidadania

Tipo: Pesquisa

Resumo:

Introdução: As doenças diarreicas agudas têm como principal sinal de manifestação o aumento do número de evacuações, com presença de fezes aquosas ou com pouca consistência, durante o período de 24 horas (BÜHLER,2014). A terapia de reidratação oral consiste em uma importante estratégia na prevenção da diarreia. A mesma é eficaz em 95% dos casos de diarreia que cursam com desidratação, perda de água e eletrólitos (OLIVEIRA, et al 2019). Objetivo: Avaliar o uso da terapia de reidratação oral por mães de crianças menores de 5 anos no tratamento da diarreia infantil. Método: Estudo com abordagem quantitativa, realizado em Unidades de Atenção Primária à Saúde nos meses de fevereiro a maio de 2019. A amostra foi composta por mães de crianças, sendo utilizado como critério de inclusão: mães que possuíam pelo menos um filho(a) com idade inferior a 5 anos. Critério de exclusão: mães que apresentavam restrições que as impossibilitassem de compreender os instrumentos utilizados. A coleta de dados ocorreu por meio de uma entrevista, sendo utilizado um instrumento abordando variáveis sociodemográficas, sobre diarreia infantil e o manejo deste agravo. Os dados foram tabulados no programa Microsoft Excel 2013 e analisados no programa EpiInfo versão 7.2. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, conforme parecer nº 3.111.549. Resultados: Participaram do estudo 98 mães de crianças menores de cinco anos. Em relação às crianças, prevaleceu o sexo feminino (53,06%; N=52), sendo que 73,47% (N=72) da amostra apresentou algum episódio diarreico, destes 45,83% (N=33) apresentaram caso de diarreia aguda. Das mães que relataram diarreia nos filhos 45,83% (N=33) fizeram uso de receitas caseiras, sendo que 22,45% (N=22) ofereceram o soro caseiro e 37,75% (N=37) das mães ofereceram o soro de reidratação oral para o tratamento da diarreia, destas, 93,33% realizaram a diluição do mesmo de maneira correta. Conclusão: Observamos que a terapia de reidratação oral é frequentemente utilizada por mães de crianças menores de 5 anos no tratamento da diarreia infantil. Nota-se ainda, que as mães se mostraram capazes de realizar a diluição do SRO de maneira satisfatória.