Trabalho apresentado no 22º CBCENF

Título: HIPODERMÓCLISE: O VIÉS ENTRE O POTENCIAL E O DESCONHECIMENTO

Relatoria: VANESSA ROSSETTO

Autores: Terezinha Aparecida Campos
Aline Ferreira Leite Revers

Modalidade: Pôster

Área: Tecnologias, Pesquisa, Cuidado e Cidadania

Tipo: Relato de experiência

Resumo:

Introdução: A hipodermóclise é uma via subcutânea para administração de medicamentos que pode ser utilizada, por exemplo, pacientes em cuidados, em inviabilidade de uso da via oral e situações de rede venosa periférica frágil. Apesar de antiga, esta técnica é pouco usual nos serviços. Objetivo: Prestar suporte técnico à equipe de enfermagem da Atenção Primária à Saúde (APS) para realizar a hipodermóclise, no domicílio, para administração de antimicrobiano. Metodologia: Após solicitação de suporte técnico à equipe do Programa de Atendimento Residencial (PAR), pela APS, para avaliação e conduta referente à possibilidade de administrar antimicrobiano pela via subcutânea. Na visita domiciliar avaliou-se rede venosa periférica frágil e a necessidade de realizar a hipodermóclise. Assim, guarnecido da prescrição médica do antimicrobiano, compatível com a via de administração, a enfermeira do PAR realizou o procedimento explicando a técnica à equipe de enfermagem da APS. Para o procedimento foi usado cateter flexível nº 22 e selecionado a região abdominal para punção. O ciclo do antimicrobiano (14 dias) foi administrado pela hipodermóclise, com rodízio de locais entre abdômen e tórax anterior, com tempo médio de permanência do cateter de sete dias, conforme recomendado pelo procedimento operacional padrão da instituição. Resultado: De acordo com a proposta terapêutica o antimicrobiano foi administrado por infusão intermitente e a manutenção da via com S.F. 0,9% 500 ml, por infusão gravitacional. Essa conduta permitiu o tratamento, no âmbito domiciliar, de forma segura e sem intercorrências. Conclusão: Considerando as vantagens da hipodermóclise - fácil manejo, menor risco de infecção, menos doloroso - faz-se necessário ampliar o conhecimento e a divulgação das experiências, pois a hipodermóclise permite a administração de medicamentos para além do ambiente controlado, nesse caso, no domicílio.