

## Trabalho apresentado no 22º CBCENF

**Título:** RELEVÂNCIA DA DOR NO PACIENTE INFARTADO  
**Relatoria:** Luisa Pradié Algayer  
Susane Flores Cosentino  
Ivania Mundstock  
**Autores:** Caroline Meinicke Grabski  
Luan do Amaral Post  
Caroline Medeiros de Carvalho  
Giovana Dornelles Callegaro Higashi  
**Modalidade:** Pôster  
**Área:** Tecnologias, Pesquisa, Cuidado e Cidadania  
**Tipo:** Pesquisa  
**Resumo:**

**INTRODUÇÃO:** A diminuição da passagem de sangue para o coração acarreta na morte das células cardíacas. Este fenômeno caracteriza-se por infarto agudo do miocárdio (IAM), ou ainda, conhecido usualmente, por ataque cardíaco ou infarto. Tem como motivo principal, o acúmulo das placas de gordura na porção interna das artérias responsáveis por transportarem sangue arterial ao coração. **OBJETIVO:** Avaliar os aspectos que norteiam a dor torácica como um dos principais sintomas associados ao IAM. **METODOLOGIA:** Para o desenvolvimento desse estudo foi realizado uma revisão bibliográfica entre maio e junho de 2018, onde foram consultados artigos presentes na Biblioteca Virtual em Saúde e por artigos científicos selecionados por meio de busca no banco de dados do Scielo, foram utilizados os seguintes descritores: “dor”; “manejo da dor”; “infarto agudo do miocárdio” onde foram selecionados três artigos que nortearam o estudo dentre eles, dois da MEDLINE e um da plataforma LILACS. **RESULTADO:** Foi constatado que na avaliação da dor torácica é possível realizar o diagnóstico precoce do IAM, que visa prevenir e limitar os danos causados ao músculo cardíaco, para que possam ser aplicados os cuidados emergenciais, aumentando assim, a chance de sobrevivência do paciente infartado para sua melhor reabilitação. Desta forma, a dor típica é precordial, com irradiação para membros superiores (preferencialmente à esquerda), mandíbula, ombros, dorso e região epigástrica, tendo agregados sintomas como dispneia, diaforese, náuseas e vômitos, palidez e extremidades frias. Entretanto, é possível verificar que os sintomas típicos se apresentam em uma parcela dos pacientes, sendo que, sintomas atípicos podem ser percebidos em grupos como idosos, mulheres e diabéticos, o que pode acarretar em diagnóstico errôneo de outras patologias. **CONCLUSÃO:** Foi concluído com esse estudo que a dor torácica é um dos principais sintomas do IAM e deve ser avaliada rapidamente para que haja os devidos cuidados, assim como associar a dor torácica com outros sintomas para que possa ser revertido o caso de IAM e traga benefícios ao paciente diminuindo as probabilidades de desenvolver sequelas. **Descritores:** Dor; Manejo da Dor; Infarto Agudo do Miocárdio.