

Trabalho apresentado no 22º CBCENF

Título: CARACTERIZAÇÃO DE PACIENTES COM ULCERAS POR PRESSÃO EM UMA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE GESTÃO PRIVADA

Relatoria: Viviana de los Angeles Galarza
Viviana de los Angeles galarza

Autores: Ercilio Miguel Martinez
Jose Luis Avalos

Modalidade: Comunicação coordenada

Área: Tecnologias, Pesquisa, Cuidado e Cidadania

Tipo: Pesquisa

Resumo:

Introducción: En pleno siglo XXI, las Ulceras por Presión (UPP) que durante mucho tiempo fueron infravaloradas, siguen siendo una preocupación latente en las instituciones de salud, debido a las consecuencias que producen en la vida de las personas como también en el aumento de los costes tras la prolongación en la internación, lo cual cobra mayor relevancia al tener presente que las investigaciones sostienen que son prevenibles en un 95% de los casos. Por su directa vinculación con la seguridad de los pacientes, entendida como la dimensión de la calidad asistencial que busca reducir y prevenir los riesgos asociados a la atención sanitaria, resulta imprescindible el rol del enfermero munido de los avances científicos para llevar a cabo protocolos específicos que contribuyen a prevenir las UPP. En ésta línea, este trabajo se llevo a cabo en la provincia de Misiones - Argentina, en una Institución de Gestión Privada (IGPR) con el objetivo medir la Prevalencia (P) y caracterizar los pacientes que presentan UPP en la IGPR. Metodología: Estudio descriptivo, cuantitativo, la población estuvo constituida por los sujetos de cuidados de la Unidad de Cuidados Intensivos (UTI), sector de internación Clínica Quirúrgica (CQ) de IGPUR. Resultado: Primer muestra: P: 44% de UPP sobre un total de 36 pacientes. Sexo femenino 31%, masculino 69%. La edad promedio fue 76 años. La (P) en el sector CQ, sobre un total de 27 pacientes, fue de 44%, en UTI: 44% sobre un total de 9 pacientes. Localización: Sacra 34%; trocánter 4%; talón 50%, maléolos 4%; pabellón auricular 4% y codo 4%. Estadiaje: Grado I 39%; Grado II 34%; Grado III 15%; Grado IV 12%. Segunda toma de muestra: (P): 32,5% sobre un total de 40 pacientes. Sexo femenino 35%, masculino 65%. La edad promedio fue 76 años. La (P) de UPP en el sector de CQ sobre un total de 28 pacientes fue de 32,14%, en UTI 33,33% sobre un total de 12 pacientes. En cuanto a la localización de las UPP, las lesiones Zona Sacra: 34%; Trocánter 4%; Talón 50% Maléolos 12%. Estadiaje: Grado I 45%; Grado II 31%; Grado III 12%; Grado IV 12%. Conclusión: El contar con datos epidemiológicos propios de la institución brinda una real dimensión de la problemática UPP y a la vez ofrece herramientas para la elaboración e implementación de un protocolo de prevención que permite direccionar las intervenciones del colectivo enfermero en la prestación de un servicio seguro, de calidad y libre de riesgos.