

## Trabalho apresentado no 23° CBCENF

Título: CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DO TESTE DE PAPANICOLAOU EM JUAZEIRO DO NORTE-CE NO PERÍODO

2017-2020

Relatoria: Igor Lucas Figueredo de Melo

Vanessa Ruth Ferreira da Silva

Carliane Bastos de Lavor

Luana Dária Medeiros Silva

Ana Paula Agostinho Alencar Lauanda Nogueira Cândido

Petrúcya Frazão Lira

Modalidade: Comunicação coordenada

Área: TECNOLOGIA, PESQUISA, CUIDADO E CIDADANIA

**Tipo:** Pesquisa

Resumo:

O Teste de Papanicolaou é o principal método de rastreio do câncer do colo do útero, sendo seu nome uma homenagem ao patologista grego Georges Papanicolaou. Deve ser oferecido a qualquer um com colo do útero, incluindo mulheres cis, homens trans e pessoas não binárias designadas mulheres ao nascer, com idade de 25 a 64 anos e que já tiveram atividade sexual. O protocolo no Brasil estabelece a repetição do exame preventivo a cada três anos, depois de dois resultados normais consecutivos no intervalo de 1 ano. Os Enfermeiros estão legalmente habilitados em coletar o material necessário nesse exame. O objetivo deste estudo foi analisar as notificações da realização do Teste de Papanicolaou no município de Juazeiro do Norte-CE entre 2017 e 2020. Tratou-se de uma pesquisa com abordagem quantitativa, do tipo descritiva e retrospectiva. Foram coletados dados secundários do Sistema de Informação do Câncer - SISCAN (colo do útero e mama), sobre a notificação da realização do exame citopatológico do colo de útero e se os resultados estão dentro da normalidade, no município de Juazeiro do Norte-CE no período 2017-2020. A pesquisa foi realizada no mês de agosto de 2021. No ano de 2017, foram notificados 5.426 exames, os quais 11 estavam dentro da normalidade e 5.415 não. No ano de 2018, houve 8.982 notificações, com 21 resultados dos testes dentro da normalidade e 8.961 não. Em 2019, notificou-se 10.743 testes, sendo 9 com resultado normal e 10.734 não. Em 2020, houve um total de 4.425 notificações dos exames, constando-se 5 de resultado normal e 4.420 não. Conforme os dados analisados, houve uma diminuição no número de notificações da realização do Papanicolaou, portanto, é imprescindível uma atuação mais efetiva da equipe de saúde no território, a fim de atuar no rastreio precoce do câncer do colo do útero e proporcionar uma melhor qualidade de vida a populaçãoalvo.