

## Trabalho apresentado no 24º CBCENF

**Título:** DIFICULDADES NO DIAGNOSTICO DA SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS EM ADOLESCENTES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

**Relatoria:** Maria Vanessa Mota Aguiar  
Ana Luisa Linhares Beserra Machado

**Autores:** Matheus Gomes Andrade  
Amanda Barbosa Cavalcanti

**Modalidade:** Pôster

**Área:** Inovação das práticas de cuidado

**Tipo:** Pesquisa

**Resumo:**

**INTRODUÇÃO:** A síndrome dos ovários policísticos (SPO) é um distúrbio hormonal muito comum, porém seu diagnóstico ainda é um desafio. Segundo o oncologista Dr. Dráuzio Varella, muitas mulheres só descobrem a síndrome entre os 20 aos 30 anos de idade, mas os primeiros sintomas surgem nos primeiros ciclos menstruais ainda na adolescência. **OBJETIVOS:** Compreender o diagnóstico da SOP em adolescentes e ressaltar os fatores que dificultam a sua identificação. **METODOLOGIA:** Estudo de revisão integrativa, realizando buscas nas bases de dados Scielo, Escop e PubMed. Usando os descritores “Síndrome dos Ovário Policístico” e “adolescentes”. Utilizando os operadores booleanos AND. Foram incluídos os artigos que abordassem o diagnóstico da SOP em adolescentes e excluídos os que não se encaixava nos descritores. Totalizando 6 artigos no quais apenas 2 contemplava os critérios para compor a revisão. **RESULTADOS:** Durante os estudos, foi percebido que esse tema em relação a essa faixa etária, ainda é pouco estudado e que para se diagnostica SOP nessa faixa, são usados os mesmos critérios diagnósticos em adultos, como o a Androgen Excess Association que determinou a hiperandrogenemia um fator para todas as idades. E esse aspecto é o mais comum entre as adolescentes, o que torna o diagnóstico complexo, sendo preciso fazer uma busca de outros distúrbios que possa também ocasiona essa desordem. **CONCLUSÕES:** A dificuldade de se diagnostica da SOP em adolescentes, está ligado a dificuldade de comparar os protocolos adulto, com essa faixa etária. Pois, é nesse período que ocorre o processo de maturação do organismo, o que se assemelha a um dos critérios usados no diagnóstico da SOP, como hiperandrogenemia. É notório a necessidade de protocolo específico para essa faixa etária, assim, como uma padronização em relação aos valores de testosterona entre as entidades.