

Trabalho apresentado no 24º CBCENF

Título: PADRÃO ESPACIAL-TEMPORAL DOS ÓBITOS POR CÂNCER DE MAMA NO CEARÁ NO PERÍODO DE 2011-2019

Relatoria: MARIA IZABEL FELIX ROCHA

Autores: Wady Wendler Soares Veras e Silva
Luana Savana Nascimento de Sousa Arruda

Modalidade: Comunicação coordenada

Área: Inovação das práticas de cuidado

Tipo: Pesquisa

Resumo:

Introdução: O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama, se apresentando como um grande problema de saúde pública mundial, já que é o câncer mais comum em mulheres. No Estado do Ceará, os exames para a detecção desse tipo de câncer como a mamografia, ultrassonografia, ressonância magnética entre outros, se encontram escassos, proporcionando o aumento das taxas de mortalidade durante os anos investigados. **Objetivo:** Descrever o perfil epidemiológico e o padrão espaço-temporal dos óbitos por Câncer de Mama ocorridos no Estado do Ceará. **Metodologia:** Estudo ecológico em que foram considerados todos os óbitos por Câncer de Mama ocorridos entre residentes do Estado do Ceará notificados no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) no período de 2011 a 2019. Os dados foram obtidos no sítio eletrônico do Departamento de Informática do SUS, o qual é de domínio público. Para a análise descritiva utilizou-se estatística univariada. Os softwares TerraView 4.2.2 e QGIS 2.14.17 foram usados para o cálculo da estatística espacial e elaboração dos mapas, respectivamente. **Resultados e Discursão:** Foram registrados 5.568 óbitos por Câncer de Mama no Ceará no período analisado. A maioria dos indivíduos era do sexo feminino (5479; 98,4%), raça parda (3429; 63,16%) faixa etária de 50 a 59 anos (1315; 23,61%) tinham escolaridade de 1 a 3 anos (1300; 26,76%) e eram casados (2292; 42,77%). A taxa de mortalidade média bruta no período foi de 6,95 óbitos por 100.000 habitantes com tendência linear de crescimento. As maiores taxas de mortalidade por Câncer de mama foram identificadas nos municípios de Granjeiro, Ibicuitinga, Abaiara, Pacujá, Baixio e Pindoretama. O câncer de mama acomete ambos os sexos, no entanto, as mulheres são mais afetadas devido a maior quantidade de fatores de riscos, como a menarca precoce, menopausa tardia, uso de contraceptivos, entre outros, que estão relacionados ao desenvolvimento do câncer de mama. **Conclusão:** Estratégias de intervenção que possibilitem o rastreamento do câncer de mama devem ser aplicadas nos locais com maiores taxas de mortalidade, como forma de prevenção e detecção precoce do câncer de mama, já que quando diagnosticados em fases iniciais tem-se o aumento das chances de sobrevida e até mesmo a cura.