

Trabalho apresentado no 24º CBCENF

Título: DIAGNOSTICOS DE ENFERMAGEM EM PÓS OPERATÓRIO PEDIÁTRICO DE CIRURGIA DE JATENE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Relatoria: Ananda Oliveira Fagundes

Autores: ANDRESSA TAVERES PARENTE

Modalidade: Pôster

Área: Inovação das práticas de cuidado

Tipo: Relato de experiência

Resumo:

INTRODUÇÃO: As cardiopatias congênitas (CCG), antes da existência das técnicas cirúrgicas da atualidade - eram uma das principais causas de mortalidade em pacientes pediátricos, apenas 30% das crianças acometidas por elas conseguiam sobreviver até a vida adulta. Em países que atualizaram o cateterismo cardíaco na pediatria, a mortalidade dos recém-nascidos caiu consideravelmente, possibilitando que 85% das crianças acometidas com CCG chegassem a vida adulta. Entre as cardiopatias congênitas mais recorrentes, cerca de 8 a 10% são representadas pela transposição completa dos grandes vasos ou das grandes artérias (TGA). A mortalidade para criança que não realizam a correção cirúrgica chega em 95%. O TGA é caracterizado por uma discordância ventrículo-arterial incompatível com a vida, pois a circulação cardíaca ocorrerá em paralelo, uma do lado direito do coração e outra do lado esquerdo, sem se misturarem, não causando assim o transporte sanguíneo necessário para o funcionamento fisiologicamente adequado do corpo humano. Um dos principais sintomas primeiramente perceptíveis no recém-nascido acometido por TGA é a cianose, piorada quando há choro, ou quando a criança mama. Outros sintomas recorrentes são a hipoxemia grave e a acidose, que irão depender de outros fatores, como a mistura sanguínea e o fluxo pulmonar. Destacar os diagnósticos de enfermagem direcionada a esse paciente visa garantir a aplicação dos cuidados prescritos, entre outros. **OBJETIVOS:** Identificar os principais diagnósticos de enfermagem a um paciente cardiopata pediátrico com histórico de TGA pós realização de cirurgia de Jatene. **RESULTADOS:** De acordo com a avaliação do histórico do paciente, e para este caso foram atribuídos os seguintes diagnósticos de enfermagem: 1- Déficit no autocuidado para banho relacionado a motivação diminuída; 2- Comunicação verbal prejudicada relacionada a barreira ambiental; 3- Interação social prejudicada relacionado a barreira de comunicação; 4- Déficit no autocuidado para higiene íntima definida por capacidade prejudicada de levantar-se do vaso sanitário. **CONCLUSÃO:** A partir da experiência relatada, percebe-se a importância da realização de uma boa identificação dos diagnósticos de enfermagem, para assim oferecer um melhor cuidado para o paciente sob nossa responsabilidade. Dessa forma, se faz necessário o conhecimento integral das etapas do cuidado, assim como de suas aplicações, para então buscar o reestabelecimento da saúde de forma mais eficiente.