

## Trabalho apresentado no 25º CBCENF

**Título:** PERFIL CLÍNICO DE MULHERES COM NEOPLASIA MAMARIA ATENDIDAS EM MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA PÚBLICA

**Relatoria:** ROMEL JONATHAN VELASCO YANEZ  
Cristina Poliana Rolim Saraiva dos Santos  
Erlaine de Freitas Corpes

**Autores:** Natália Frota Goyanna  
José Jeová Mourão Netto  
Ana Fátima Carvalho Fernandes

**Modalidade:** Comunicação coordenada

**Área:** Tecnologia, empreendedorismo e inovação no cuidado em Enfermagem

**Tipo:** Pesquisa

**Resumo:**

**Introdução:** O câncer de mama continua sendo o câncer de mama mais prevalente e com as maiores taxas de mortalidade entre o público feminino. No Brasil, para o triênio 2023-2025, são estimados 73.610 casos novos, sendo o Ceará um dos seis estados com maior risco estimado. **Objetivo:** Descrever as características clínicas de mulheres com câncer de mama. **Metodologia:** Estudo transversal, descritivo, realizado em uma maternidade universitária pública da cidade de Fortaleza/Ceará. A amostra foi composta por 72 mulheres que foram atendidas na consulta de enfermagem pré-cirúrgica no período de julho/2022 a junho/2023. Para coleta de dados, foi utilizado um instrumento de dados sociodemográficos e clínicos previamente validado pelos autores. Para análise dos dados, foi utilizada estatística descritiva (porcentagens e frequências) e inferencial (Teste de Fisher). O estudo foi aprovado por um comitê de ética em pesquisa. **Resultados:** A média de idade foi de 52,2 anos ( $\pm 12,6$ ), a maioria não tinha histórico pessoal (76,3%) ou familiar de câncer (51,3%), apresentava comorbidades (56,9%) Em relação ao perfil ginecológico, a média de idade da menarca foi de 13,4 anos ( $\pm 1,8$ ), a maioria amamentou (80,6%), estava na menopausa (70,8%) e havia feito uso de anticoncepcional (77,7%). Quanto aos hábitos de saúde, a maioria não pratica atividade física (69,4%), não fuma (68%) e não ingere bebidas alcoólicas (86,1%). Em relação ao tipo histológico do câncer, predominou o carcinoma ductal invasivo (77,7%), seguido do carcinoma ductal in situ (9,7%). Foi feita associação entre uso de anticoncepcional ( $p=0,9506$ ), atividade física ( $p=0,4864$ ) com o tipo de câncer, mas não foi significativa. **Conclusões:** O carcinoma ductal invasivo continua a ser o tipo de neoplasia mais prevalente entre a população feminina e apesar de não ter significância na associação, percebe-se a influência dos hormônios e da atividade física no desenvolvimento do câncer, situação já bem descrita na literatura.