

Trabalho apresentado no 25º CBCENF

Título: INFLUÊNCIA DOS ANTICONCEPCIONAIS ORAIS NO SURGIMENTO DA TROMBOSE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Relatoria: Kathleen khamony Lira Carvalho
Watina Rodrigues Dias

Autores: Larissa De Azevedo Silva
Daiane Felipe De Brito
Cristiana Maria De Araújo Soares Gomes

Modalidade: Pôster

Área: Formação, Educação e Gestão em Enfermagem

Tipo: Pesquisa

Resumo:

Introdução: Com os avanços da ciência em estudos de endocrinologia, reprodução e fisiologia, a pílula anticoncepcional foi criada no século XX. No ano de 1960 a pílula anticoncepcional foi usada para objetivos de prevenir a gravidez. A trombose venosa ocorre pelo bloqueio dos vasos devido abundância de plaquetas e fibrinas. No ano de 2015, 113.817 internações relacionadas a trombose foram registradas no Brasil, com o grau de incidência maior em mulheres, de faixa etária 20 a 40 anos de idade que fazem uso de anticoncepcionais. A correlação entre Anticoncepcionais orais e tromboembolismo venoso se dá pelo aumento do hormônio estrógeno e peso corporal da mulher. Pacientes com histórico familiar de tromboembolismo, a organização mundial de saúde não aconselha o uso do anticoncepcional hormonal. Com o grande número de mulheres que fazem uso desse método de contracepção, é preciso o rastreamento dessas usuárias para identificar as possíveis alterações que esses hormônios possam acarretar. Objetivo: Evidenciar a influência exercida pelo uso dos anticoncepcionais orais no surgimento da trombose, bem como promover saúde nesse contexto. Metodologia: O presente trabalho foi elaborado por meio de uma revisão bibliográfica, após seleção de artigos publicados entre os anos de (2019-2022). O levantamento dos artigos se deu nas seguintes bases de dados científicos, Biblioteca virtual em saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Google acadêmico. Resultados: Em virtude das informações supracitadas, observamos que os hormônios presentes nas composições de anticoncepcionais orais, contribuem para o desenvolvimento de trombose. Considerações finais: Mediante as literaturas encontradas, podemos relacionar o uso de anticoncepcionais orais, peso corporal e trombose venosa hereditária ao surgimento de tromboembolismo venoso. Para que possa ser evitado, é necessário acompanhamento médico para fazer uso do medicamento, tendo em vista o histórico de saúde da paciente.