

Trabalho apresentado no 25º CBCENF

Título: FATORES CONTRIBUINTES PARA INCIDENTES DE QUEDA DE RECÉM-NASCIDOS EM ALOJAMENTO CONJUNTO: PERSPECTIVA DAS MÃES

Relatoria: Victoria Lohreine de Carvalho Grangense
Brena Luthe Viana do Nascimento

Autores: Larissa Rayane Santos Mota
Sheimar Maciel de Oliveira
Roberta Meneses Oliveira

Modalidade: Comunicação coordenada

Área: Formação, Educação e Gestão em Enfermagem

Tipo: Pesquisa

Resumo:

Introdução: A hospitalização é um fator de risco para ocorrência de quedas, entretanto, as quedas em recém-nascidos (RN) ainda possuem uma taxa de incidência desconhecida. Tal fator dificulta a avaliação dos riscos e a criação de políticas preventivas nessa população. Nas maternidades, a queda do RN ocorre quando o profissional de saúde, familiar ou acompanhante deixa o bebê escorregar dos braços ou quando ele cai de uma superfície, gerando ou não algum dano. **Objetivo:** compreender a percepção de mães de RN sobre incidentes de quedas em unidade de alojamento conjunto (AC), incluindo seus fatores contribuintes e consequências. **Metodologia:** Estudo descritivo, com abordagem qualitativa, recorte de pesquisa maior fundamentada na metodologia de Design Thinking com objetivo de desenvolver intervenção para incidentes de queda de RN em alojamento conjunto. Realizou-se na maternidade de complexo hospitalar universitário de Fortaleza-CE, em 2023, por meio de entrevistas com 34 mães de RN, com idade a partir de 18 anos, internadas no alojamento conjunto, por no mínimo, um dia. As respostas foram gravadas, transcritas e submetidas à análise de conteúdo categorial temática, com quantificação das unidades de registro/contexto (UR/UC) por categoria. A análise das 34 entrevistas resultou em 4 categorias. Este resumo apresenta os resultados da cat. 2, com 6 subcategorias, que resultou em 72UR/UC. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética (nº 67759223.3.0000.5050). **Resultados:** Na cat. relacionada aos fatores contribuintes para quedas de RN no AC, destacaram-se: transporte do RN no colo (23UR/UC), sentir sono com o RN no colo ou amamentando (18UR/UC), RN dormindo na cama com a mãe (12UR/UC), dormir com o RN no colo ou amamentando (11UR/UC), uso de alguma medicação que causa tontura/sonolência (4UR/UC), RN na cama da mãe sem supervisão (4UR/UC). As mães relataram cansaço, durante a amamentação ou quando estavam com o RN no colo, seguido de sentimentos de medo, insegurança e culpa. Uma das mães declarou que adormecer com o filho no colo foi algo preocupante e que após o acontecido sentiu-se culpada. O que demonstra a exaustão materna como agravante para o surgimento de fatores contribuintes para quedas em RN durante a internação no AC. **Considerações finais:** As mães de RN internados em AC demonstram conhecimento dos fatores de risco e consequências para quedas, podendo participar dos processos de promoção da segurança do paciente neste cenário.