

Trabalho apresentado no 25º CBCENF

Título: EXTRAÇÃO DE LEITE HUMANO À BEIRA LEITO EM AMBIENTE NEONATAL E O ARCO DE MAGUEREZ

Relatoria: ROSY DENYSE PINHEIRO DE OLIVEIRA

janaina landim de sousa

Autores: icleia parente rodrigues

Antonia Rita de Fátima Abreu de Carvalho

Edna Maria Ferreira Lima

Modalidade: Pôster

Área: Tecnologia, empreendedorismo e inovação no cuidado em Enfermagem

Tipo: Relato de experiência

Resumo:

INTRODUÇÃO: O leite materno além de ser a melhor alimentação para bebês, contribui para redução de até 13% da mortalidade infantil em menores de cinco anos de idade. Dentre as estratégias para intensificar o aleitamento materno e manutenção da lactação, está a extração de leite humano em ambiente neonatal. Com a pandemia, novos obstáculos surgiram, como o distanciamento das mães nas unidades neonatais repercutindo em prejuízos das estratégias para melhoria do aleitamento materno e manutenção da lactação em mães de recém-nascidos pré-termo, como a redução nas taxas de extração de leite a beira do leito em ambiente neonatal. **OBJETIVO:** Descrever a extração de leite à beira leito nas unidades neonatais após a pandemia de covid-19, utilizando a metodologia do Arco de Magueres. **METODOLOGIA:** O estudo realizado foi do Tipo Relato de Experiência, utilizando a metodologia do Arco de Magueres, em hospital de referência em saúde da mulher e da criança, em Fortaleza/Ceará, nos meses de fevereiro a agosto de 2022, fazendo parte das atividades do Curso de especialização em enfermagem neonatal do Instituto Fernandes Figueira (IFF). **RESULTADOS:** Nos Recém-nascidos pré-termo (RNPT), o leite da própria mãe deve sempre ser a primeira escolha. Com isso, o foco do estudo teve como base as estratégias para manutenção da lactação em mães de recém-nascidos prematuros com ênfase na extração de leite à beira leito. Dos fatores associados encontraram-se: Interrupção da ordenha na beira do leito, ausência de protocolo definido, falta de sensibilização da equipe, superlotação, dificuldade no livre acesso da mãe decorrente do agravamento da pandemia, ausência de local de apoio para as mães, baixa adesão dos profissionais aos treinamentos, baixo estoque de leite humano pasteurizado para demanda. Com base nos aspectos identificados foi desenvolvido Procedimento Operacional Padrão (POP) e Fluxo de Extração de leite em ambiente neonatal, reuniões com setores envolvidos, realizados treinamentos e sensibilização com as equipes, envolvendo também a residência multiprofissional. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Com o controle da pandemia, foi possível retornar boas práticas que não estavam sendo realizadas ou que foram reduzidas, como a extração de leite a beira do leito em ambientes neonatais e o contato pele a pele, porém foram necessárias algumas ações para contribuir com esse retorno, como treinamentos e sensibilizações dos profissionais.