

## Trabalho apresentado no 26º CBCENF

**Título:** CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DA INFECÇÃO PELO HERPES VÍRUS SIMPLES NO RN

**Relatoria:** Geovan Ribeiro de Lima  
João Marcos Rocha Marinho  
Emanoel Rodrigues Martins

**Autores:** Luana Almeida Gomes  
Eduarda Lopes de Jesus  
Rômulo Pinheiro Santos

**Modalidade:** Pôster

**Área:** Eixo 1: Assistência, gestão, ensino e pesquisa em Enfermagem

**Tipo:** Pesquisa

**Resumo:**

**INTRODUÇÃO:** As infecções congênitas são as patologias adquiridas durante o período de vida intrauterino fetal, desta forma, foi criado o acrônimo "STORCH" que abrange um agrupado de doenças congênitas, entre elas está a Herpes-vírus simples (HSV), que possuem alta morbidade no recém-nascido (RN) que pode desenvolver manifestações neurológicas, mucocutâneas, ou disseminadas; o diagnóstico é realizado por meio do histórico de infecções prévias, exame físico e teste sorológicos para HSV 1 e 2. **OBJETIVO:** Mostrar os cuidados que o enfermeiro pode oferecer para prevenir o recém-nascido da infecção por HSV. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão narrativa de caráter descritivo realizado nas bases de dados Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), MedLine, Lilacs e Scielo, por intermédio dos descritores em ciências da saúde (DeCS): Enfermagem; Recém-Nascido; Herpes-Vírus Simples. Utilizando como critério de busca, artigos publicados entre 2019 a 2024 nos idiomas Inglês e Português. **DISCUSSÃO/RESULTADOS:** O HSV pode ocasionar alterações no desenvolvimento infantil causando atraso neuropsicomotor, hipotonia, movimentos distônicos, automatismo, episódios de convulsões, diminuição de consciência, entre outros. Dessa forma, o enfermeiro no pré-natal precisa manter o acompanhamento com importância na busca do diagnóstico precoce e das intervenções necessárias na saúde materno-infantil, evitando o atraso do tratamento. Ademais, o profissional enfermeiro na atenção ao pré-natal precisa realizar testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST's), além da realização da avaliação ginecológica conforme preconizado o Ministério da Saúde em busca de sinais e sintomas de herpes, que normalmente manifesta-se com o aparecimento de lesões vesiculosas, que se transformam em pequenas úlceras com aumento de sensibilidade, formigamento, ardência, mialgia e prurido. Diante do exposto, o enfermeiro tem o papel fundamental na prevenção, diagnóstico e tratamento do HSV, sendo utilizada a terapêutica medicamentosa com aciclovir, 400mg, por via oral, a cada 8h, durante sete dias. **CONCLUSÃO:** Portanto, a detecção precoce feita no pré-natal é de fundamental importância na prevenção de eventuais complicações da infecção do HSV ao RN, uma vez que o enfermeiro tem o papel fundamental na investigação e eliminação dos episódios de risco aos RNs.