

Trabalho apresentado no 26º CBCENF

Título: FATORES ASSOCIADOS AO DESFECHO CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS VENOSAS POR GRUPOS ETÁRIOS

Relatoria: Matheus Medeiros de Oliveira

Mário Lins Galvão de Oliveira

Autores: Zander Júnior Bento de Moraes

Isadora Costa Andriola

Gilson de Vasconcelos Torres

Modalidade: Pôster

Área: Eixo 1: Assistência, gestão, ensino e pesquisa em Enfermagem

Tipo: Pesquisa

Resumo:

Introdução: As úlceras venosas (UV) são soluções de descontinuidades da superfície da pele relacionadas à Insuficiência Venosa Crônica, o qual ocasiona um quadro de obstrução do fluxo sanguíneo, isquemia e, por conseguinte, ulceração do tecido. O processo cicatricial é alongado e influenciado por diversos fatores. A prevalência e incidência das UV é maior nas pessoas idosas, com mais de 60 anos, logo, estão mais suscetíveis a desenvolvê-la, quando comparado com a população com menos de 59 anos. Objetivo: Avaliar os fatores associados em pessoas com Úlceras Venosas ao desfecho "cicatrização da ferida" segundo a faixa etária. Método: Trata-se de um estudo transversal e qualitativo, realizado durante 2020 e 2021, no Centro Especializado de Tratamento de Úlceras Crônicas, Parnamirim/Brasil. A coleta de dados utilizou a aplicação de instrumentos sociodemográficos, clínicos, assistenciais e de saúde, juntamente com avaliação clínica da lesão. Os dados foram tabulados no Microsoft Excel e analisados no Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows, por meio dos Testes de Qui-quadrado de Pearson e do Sinal, sendo adotado como significativo p-Valor < 0,005, com margem de erro de 5%. A pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética e os participantes assinavam um Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Resultados/Discussão: No grupo das pessoas idosas, a análise estatística mostrou, que foram importantes os fatores clínicos, assistenciais e hábitos de vida para a cicatrização das feridas. Enquanto, nos usuários de até 59 anos, foram: as variáveis clínicas, assistenciais, hábitos de vida e sociodemográficas. Considerações finais: Identifica-se a associação dos fatores sociodemográficos, clínicos, assistenciais e os hábitos de vida com a cicatrização de úlceras varicosas em todos os grupos etários. As condições não modificáveis, como idade, influenciam no risco de desenvolvimento das lesões, por outro lado, as modificáveis, como hábitos de vida, fatores assistenciais e adesão ao tratamento, podem determinar o prognóstico da doença, os impactos na vida dos pacientes e o desfecho da UV.