

Trabalho apresentado no 26º CBCENF

Título: PREVALÊNCIA DA HEMORRAGIA PÓS-PARTO RELACIONADA A VIA DE PARTO EM UMA MATERNIDADE DE ALTO RISCO

Relatoria: Bárbara Maria Silva Machado
Vitória Gabriely Félix de Souza

Autores: Nathalya Anastacio dos Santos Silva
Viviane Maria Gomes de Araújo

Modalidade: Comunicação coordenada

Área: Eixo 1: Assistência, gestão, ensino e pesquisa em Enfermagem

Tipo: Pesquisa

Resumo:

INTRODUÇÃO: A hemorragia pós-parto (HPP), é a perda sanguínea a partir de 500 ml após parto vaginal, a partir de 1000 ml após parto cesariana nas primeiras 24 horas, ou perda de sangue por via vaginal que possa causar instabilidade hemodinâmica, ou ainda perda de sangue pelo trato genital capaz de causar instabilidade hemodinâmica. **OBJETIVO:** Descrever a associação entre a via de parto e ocorrência de HPP em uma maternidade de alto risco. **MÉTODO:** Trata-se de um estudo transversal do tipo descritivo, exploratório com abordagem quantitativa. A população do estudo foi composta por 85 mulheres atendidas na sala de parto da maternidade de uma instituição filantrópica no Recife. Foram incluídas as mulheres que apresentaram HPP na sala de parto, nas quais a assistência ao parto foi realizada dentro da instituição. Essa pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira e aceita sob o CAAE: 70324523.4.0000.520. **RESULTADOS:** A pesquisa foi realizada nos meses de junho a agosto, o serviço realiza habitualmente uma média de 5.000 partos por ano e uma média de 400 parto por mês no total. Nos meses de junho a agosto aconteceram 1.119 partos, 589 cesáreas e 502 partos normais, 28 partos instrumentais (fórceps), O total de 1.119 de partos que aconteceram no período da pesquisa, (7,59%) foram diagnosticados HPP, (7,64%) dos partos cesáreos, (7,37%) dos partos normais, e (10,71%) dos partos com fórceps. **DISCUSSÃO:** O percentual de (53,94%) que a via de parto com maior prevalência de HPP foi a via de parto cesáreo, o que corrobora com a OMS, que traz a cesariana com maior índice de complicações, maior prevalência de HPP e contribui para o aumento das taxas de mortalidade materna, o percentual de parto cesáreo pode acontecer por se tratar de um serviço de alto risco, porém o serviço mostra que ainda sim os partos instrumentais e cirúrgicos apresentam um percentual maior de ocorrência HPP. **CONCLUSÃO:** O perfil das ocorrências da hemorragia pós-parto, acontecem mais em partos cesáreos, porém o fato que chamou atenção foi o quantitativo de partos instrumentais que tiveram a HPP como desfecho também alto, dessa forma é importante a educação perinatal sobre os riscos de todas as vias de parto.