

Trabalho apresentado no 26º CBCENF

Título: CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE HEMORRAGIA POS-PARTO

Relatoria: Raylle Tauanny Alves Gomes

Autores: Ryan Pereira Tarquino
Francisca Rhayra Gonçalves Moraes

Modalidade: Pôster

Área: Eixo 1: Assistência, gestão, ensino e pesquisa em Enfermagem

Tipo: Pesquisa

Resumo:

INTRODUÇÃO: A hemorragia pós-parto é a principal causa de mortes maternas, uma situação de sangramento é considerada HPP quando a perda sanguínea for maior que 500 ml após o parto vaginal, e maior que 1000 ml após a cesariana, durante as primeiras 24 horas, apresentando como principal causa; atonia uterina, atetismo placentário ou retenção placentária, traumas como lacerações ou roturas uterinas, distúrbios de coagulação e síndromes hipertensivas, ao qual podem levar a complicações como o choque hipovolêmico. A equipe de enfermagem possui um papel de grande importância na prevenção e nos cuidados da HPP. **OBJETIVO:** descrever os cuidados de enfermagem para prevenção de hemorragias pós-parto. **MÉTODOS:** trata-se de uma revisão integrativa da literatura a fim de sintetizar e auxiliar o conhecimento acerca da temática, através de produções e evidências científicas. A busca ocorreu através das bases de dados: Lilac's, Pubmed, e MEDLINE via BVS. De acordo com os descritores em saúde: "cuidado de enfermagem fechar", "prevenção", e "hemorragia pós-parto". A busca foi realizada de janeiro a julho de 2023. Foram identificados 98 artigos após a seleção de filtros, por fim tendo como base os critérios de inclusão a leitura e análise temática foram descartados 89 artigos, a amostra foi composta por 9 artigos que abordaram elementos importantes sobre o cuidado e a prevenção da hemorragia pós-parto dos últimos cinco anos. **RESULTADOS:** A equipe de enfermagem possui papel crucial no reconhecimento e identificação de fatores de risco para hemorragias. Durante as primeiras 24 horas de pós-parto é importante aferição de sinais vitais, mensuração da perda sanguínea, palpação do Globo, segurança de pinard, massagem no fundo do útero, punção de um acesso venoso calibroso, monitoramento da oximetria e estímulo à amamentação, a fim de fortalecer o vínculo entre mãe e filho. Além disso, em casos atonia uterina, é primordial administração de medicações como ocitocina EV, e a utilização de métodos não farmacológico como o traje anti pneumático (TAN), e balão de tamponamento intrauterino. Ademais, diante de qualquer sangramento aumentado, deve-se estabelecer os protocolos de hemorragia pós-parto. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** os cuidados de enfermagem se mostraram essenciais no pós-parto, principalmente para a prevenção de complicações graves, e na redução de mortalidades maternas por consequências de hemorragias, através de uma abordagem eficaz.