Trabalho apresentado no 26º CBCENF

Título: SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTES (SCP) EM UTI PEDIÁTRICA: REFLEXO DO TRABALHO DA ENFERMAGEM

Relatoria: MARCELO WILLIAMS OLIVEIRA DE SOUZA

Autores: CAMILLA CRISTINA LISBOA DO NASCIMENTO
SANDRA DENIZE BARBOSA
JAILSON DE ASSIS RIBEIRO

Modalidade: Pôster

Área: Eixo 1: Assistência, gestão, ensino e pesquisa em Enfermagem

Tipo: Pesquisa

Resumo:

Introdução: A carga de trabalho de enfermagem tem sido mundialmente discutida nas instituições hospitalares, em razão de suas implicações na qualidade da assistência aos pacientes. Nas unidades de terapia intensiva pediátricas (UTIP), a preocupação é crescente, devido ao impacto das novas tecnologias no cuidado, da mudança do perfil dos pacientes graves e da necessidade de mão de obra especializada. Objetivo: Avaliar a carga de trabalho de enfermagem em uma unidade de terapia intensiva adulto de um hospital público estadual de alta complexidade referência em Nefrologia, Neurologia e Transplante Renal e de Fígado, com o uso do instrumento Nursing Activities Score (NAS). Método: Estudo longitudinal, retrospectivo, envolvendo dados referentes ao NAS utilizados na assistência de Enfermagem diariamente na unidade de terapia intensiva do hospital referência no período de janeiro de 2022 a maio de 2024. Para coleta dos dados utilizou-se como parâmetro o cálculo do NAS. Resultados/Discussões: Foram utilizados 284 dados de pacientes obtendo uma média de 17,95 horas de assistência de enfermagem, sendo o mês com maior índice de carga de trabalho janeiro de 2022 com 20,1 horas e o com menor índice de carga horária de trabalho o mês de maio de 2023 com 15,89 horas de trabalho de enfermagem. A indicação de admissão, tempo de permanência e a condição de saída do paciente da unidade de terapia intensiva e do hospital foram variáveis associadas a diferenças na carga de trabalho da enfermagem. Considerações Finais: Encontramos elevada carga de trabalho de enfermagem no estudo o que reflete na gravidade dos pacientes internados em UTIP. Esse resultado pode subsidiar planejamento para dimensionamento da equipe. A carga de trabalho sofreu influência de caraterísticas clínicas, sendo observado aumento do trabalho nos pacientes nefropatas, neuropatas e nos não sobreviventes.