

Trabalho apresentado no 26º CBCENF

Título: RASTREIO E SEGUIMENTO DE LESÃO INTRAEPITELIAL CERVICAL NA CONSULTA DE ENFERMAGEM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Relatoria: Polyana Keyla Ferreira Neves

Autores: Larissa Layne Soares Bezerra Silva

Modalidade: Pôster

Área: Eixo 1: Assistência, gestão, ensino e pesquisa em Enfermagem

Tipo: Relato de experiência

Resumo:

INTRODUÇÃO: O exame citopatológico é o padrão ouro para rastreamento prévio de lesões intraepiteliais cervicais não invasivas. Devido ao grande índice de mortalidade pelo câncer de colo de útero, o rastreamento precoce é fundamental. O Papilomavírus Humano (HPV) é o principal fator de risco associado às lesões e ao câncer de colo uterino, além de ter relação com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), pois possibilita a suscetibilidade do indivíduo a infecções oportunistas. De acordo com a resolução do Conselho Federal de Enfermagem nº 381/2011, a coleta pelo método de papanicolaou é privativa do enfermeiro na Consulta de Enfermagem. **OBJETIVO:** Descrever a experiência adquirida na Consulta de Enfermagem, através do rastreamento e seguimento de lesão intraepitelial cervical de alto grau em mulher soropositiva. **MÉTODO:** Relato de experiência, vivenciado no 9º período do curso de enfermagem durante o estágio obrigatório entre abril e junho de 2022, na Unidade de Saúde da Família do município de Paulista-PE, para atuação assistencial da rotina do enfermeiro na Atenção Primária à Saúde. **RESULTADOS/DISCUSSÃO:** Na anamnese, a paciente relatou dor no baixo ventre e prurido na região vaginal. Realizou o último exame preventivo em 2018 e mencionou o procedimento de cauterização no colo do útero em 2019. A usuária é portadora do HIV, diagnosticada em 2017, não aderiu ao tratamento e praticava relação sexual desprotegida. No citopatológico, presença de corrimento vaginal na cor esverdeada, sem odor fétido, colo do útero em formato de fenda, visivelmente sem anormalidades e ausência de sinais de infecção. Resultado do exame: atipias em células escamosas relacionadas à lesão intraepitelial de alto grau - Neoplasia Intraepitelial Cervical nos estágios II e III. A usuária foi alertada sobre o diagnóstico e a necessidade do tratamento, sendo encaminhada para realização de colposcopia com avaliação das lesões e acompanhamento especializado. Na infecção pelo HPV, a não adesão ao tratamento aumenta o risco de lesões cérvico-uterinas. Por isso, é imprescindível que o enfermeiro promova o aconselhamento para o tratamento das pessoas infectadas e de seus parceiros sexuais, objetivando prevenir novas infecções, bem como ofertar educação em saúde para prevenção. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** É indispensável a atuação do enfermeiro na assistência às mulheres e realização do citopatológico, visando prevenção, rastreamento e tratamento de possíveis lesões cérvico-uterinas e o câncer de colo uterino.