

Trabalho apresentado no 12º CBCENF

Título: PACIENTE COM SIDA ACOMETIDO DE DIARRÉIA

Relatoria: MARCOS WILLIAM GOMES

maria das graças viana overall

Autores: katia cilene lisboa farias nunes

mucheli souza de oliveira

valéria marcia barbosa de vascoceles

Modalidade: Pôster

Área: Integralidade do cuidado

Tipo: Pesquisa

Resumo:

Segundo JONDA (1992), nos países desenvolvidos as taxas de diarreia infecciosa são com muito menores, devido principalmente a uma melhora das condições higiênico-sanitárias. Os pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), estão pré-dispostos a sofrerem infecções intestinais, com diarreia e má absorção ocorrendo praticamente em todos os casos. Uma diarreia com menos de duas semanas de duração é considerada como aguda, podendo ser um fenômeno endêmico ou em muitos casos epidêmicas. A diarreia aguda pode ser causada por uma grande variedade de microorganismos: Vibriões, Bactérias, Virus, Protozoários e helmintos. Dessa forma, um trabalho onde iremos abordar sobre diarreia infecciosa em pacientes com SIDA. Tendo como objetivo identificar os diagnósticos de enfermagem e as prescrições para evitar as possíveis complicações. Tivemos como referência ABBOTT& JONDA (1992), GOZZARD (1996). Tendo como metodologia a revisão bibliográfica. Analisamos no decorrer deste trabalho que a enfermagem possui uma boa compreensão da fisiopatologia da infecção, para que possa realizar uma avaliação completa que se fundamente na interpretação dos exames laboratoriais. Portanto a visão holística da equipe de saúde se faz necessária para se prestar uma assistência de qualidade ao paciente, já que a diarreia é muito freqüente em pacientes com SIDA ao longo da doença, podendo ser de varias etiologias e em uma porcentagem mais reduzida de casos não se encontra uma causa orgânica.