

Trabalho apresentado no 13º CBCENF

Título: CARACTERIZAÇÃO DA ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA HEPATOESPLÊNICA EM JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE

Relatoria: GILVANILDO ROBERTO DA SILVA
Silva, Gilvanildo Roberto

Autores: Silva, Paula Carolina Valença
Domingues, Ana Lúcia Coutinho

Modalidade: Pôster

Área: Ensino e pesquisa

Tipo: Pesquisa

Resumo:

Novos casos de esquistossomose apresentam-se em expansão para algumas regiões costeiras e áreas urbanas do estado de Pernambuco, com mudanças no seu perfil clínico-epidemiológico. Estudos confirmam que focos da doença vêm surgindo em Recife e região metropolitana, destacando-se, localidades próximas das praias de Jaboatão dos Guararapes. O trabalho descreve os principais aspectos sócio-demográficos e clínicos de portadores da forma grave hepatoesplênica da esquistossomose. Estudo transversal, com 7 pacientes naturais do município de Jaboatão dos Guararapes-PE, área recente de foco, atendidos em Hospital Universitário de Recife-PE, de setembro de 2008 a março de 2009. Os casos foram diagnosticados por ultrassonografia de abdome que confirmou fibrose periportal e esplenomegalia. Comprovou-se maior ocorrência da doença em indivíduos acima de 31 anos, com predominância do sexo masculino 57,1%. A Hemorragia digestiva alta (HDA) esteve presente em 57,1% dos casos, destes, nenhum realizou tratamento prévio para hipertensão portal. Quanto ao tratamento prévio para esquistossomose, 28,6% dos pacientes não foram tratados. Observou-se a presença da Hepatite C em 14,3% dos indivíduos representando a única co-infecção existente nestes casos. O estudo sugere o aparecimento da forma grave da doença neste município, onde até o momento, não havia relatos na literatura sobre o aparecimento de casos graves em indivíduos nascidos nesta área, bem como, a gravidade destes casos pela alta frequência de episódios de HDA, mostrando a necessidade de vigilância contínua do Programa de Controle de Erradicação da Esquistossomose neste município da grande Recife.