

Trabalho apresentado no 13º CBCENF

Título: INCIDÊNCIA DE CASOS CONFIRMADOS DE TUBERCULOSE NO PERÍODO DE 2002 A 2006 NO ESTADO DO PARÁ

Relatoria: JACYARA DA COSTA CARDOSO
Orlando Sandoval Farias Júnior

Autores: Natércia Neves Marques
Elana Ivone do Socorro Campos Pereira
Lupy Racabio Cunha Bacelar

Modalidade: Pôster

Área: Ensino e pesquisa

Tipo: Pesquisa

Resumo:

Introdução: A grave situação mundial da tuberculose está intimamente ligada ao aumento da pobreza, à má distribuição de renda e à urbanização acelerada. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que haja anualmente 1,9 milhões de mortes por tuberculose. Tais mortes poderiam ser evitadas caso se fizesse o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. A notificação de casos de tuberculose é compulsória e, portanto torna-se indicador fiel do número de pacientes diagnosticados e de tratamentos iniciados

Objetivo: Verificar a incidência de casos confirmados de tuberculose no período de 2002 a 2006 no estado do Pará, que foram notificados ao SINAN, avaliando a baciloscopia, faixa etária, e o sexo acometido pela enfermidade.

Método: Os dados foram obtidos através do banco de dados do SUS (DATASUS), sendo considerados os dados obtidos pelo SINAN. Foram incluídos os casos de tuberculose confirmados e notificados ao SINAN no período de 2002-2006 no estado do Pará, sem exclusão por raça, religião, sexo ou idade.

Resultados: Notificou-se 19.999 casos tuberculose confirmados no período de 2002-2006 no estado do Pará, sendo 12.134 no sexo masculino (60,67%), 7.862 no sexo feminino e 3 de sexo ignorado. O ano com maior número de diagnósticos foi 2004, quando houve 4.119 diagnósticos confirmados notificados (20,59%). A incidência de diagnósticos confirmados notificados é crescente no período de 2002 a 2004 e decrescente de 2004 a 2006. A faixa etária mais acometida foi de 20-39 anos apresentando 9.481 casos (47,40%), e a menos acometida foi de <1 ano, com 124 casos. Quanto à baciloscopia temos, 13.463 casos positivos, 3.867 negativos, 22 ignorados ou brancos e 2.647 que não fizeram. Conclusão: Conclui-se que os casos de tuberculose confirmados notificados no estado do Pará cresceram no período de 2002 a 2004 e decresceram daí até 2006. A tuberculose acomete principalmente homens, na faixa etária de 20-39 anos e com a baciloscopia positiva. É importante atentar também, para o grande número de casos de TB com baciloscopia negativa, o que pode atrasar o diagnóstico e causar falsos negativos. Os dados coincidem com boa parte da literatura analisada que mostra a maior prevalência de TB no sexo masculino e na faixa etária de 20-39 anos.