

## Trabalho apresentado no 13º CBCENF

**Título:** CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE ÚLCERA POR PRESSÃO  
**Relatoria:** HELDER VAINER NASCIMENTO MARQUES  
Isabel Matilde da Silva Coelho  
**Autores:** Larissa Oliveira Proence  
Flavia Bezerra de Souza Melo  
Luciana Andrade Mendonça Machado e Coelho  
**Modalidade:** Comunicação coordenada  
**Área:** Ensino e pesquisa  
**Tipo:** Pesquisa  
**Resumo:**

O cuidado com a pele do paciente é uma atividade importante da equipe de enfermagem, podendo sua avaliação sugerir integridade da pele prejudicada: úlcera por pressão (UP), ou risco da UP. A mesma é caracterizada por uma lesão da pele pela associação de fatores internos e externos, após um período de fluxo sanguíneo deficiente. Essas lesões favorecem o desenvolvimento de microrganismos patogênicos e oportunistas que por sua vez podem vir agravar ainda mais o estado clínico do paciente. As UP são definidas como lesões de pele ou parte moles originadas basicamente de isquemia tecidual prolongada. A compressão dessas áreas diminui o fluxo sanguíneo local facilitando o surgimento de lesão por isquemia tecidual e necrose. O objetivo principal foi identificar fatores de UP em pacientes internados em UTI e a presença de bactérias associadas a estas lesões e possível resistência aos antibióticos utilizados na terapêutica. O estudo realizado foi prospectivo com abordagem de caráter qualitativo e descritivo. Participaram dezesseis pacientes acometidos com úlceras por pressão internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de três hospitais da cidade de Petrolina-PE. O material biológico isolado dos pacientes foi processado e realizado testes de resistência microbiana em laboratório de Análises Clínicas da rede particular. Os critérios de inclusão foram: pacientes maiores de 18 anos com UP que após a leitura do TCLE aceitaram participar do estudo. Pacientes com menos de 18 anos foram excluídos do estudo. A partir da amostra observou-se que 86% dos pacientes são idosos. Constatamos que 62.5% adquiriram durante sua estada no hospital e não na UTI. Cerca de 75% dos pacientes desenvolveram UP na região sacro/cóccix. Identificou-se que alguns dos principais fatores os quais influenciam o surgimento da UP está relacionado à idade, a hidratação da pele e a permanência na mesma posição por tratar-se de pacientes acamados. Dessa forma prevenir a úlcera por pressão é mais importante que as propostas de tratamento, visto que o custo é menor e o risco para o paciente é praticamente inexistente. Todavia, este processo deve envolver uma equipe multidisciplinar através da integralidade do cuidado para a obtenção dos melhores resultados.