

## Trabalho apresentado no 14º CBCENF

**Título:** CONHECIMENTO SOBRE ÚLCERA POR PRESSÃO EM PACIENTES COM LESÃO MEDULAR: UM ESTUDO DE ENFERMAGEM

**Relatoria:** JAIRO EDIELSON RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA  
HADYEL FREITAS SILVA

**Autores:** MORGANA MARIA DA SILVA LIMA  
EDIANNE SILVIA LUSTOSA CESAR  
SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA

**Modalidade:** Pôster

**Área:** A enfermagem e o terceiro setor

**Tipo:** Pesquisa

**Resumo:**

**INTRODUÇÃO:** A lesão medular (LM) ocorre em cerca de 15 a 20% das fraturas da coluna vertebral, sendo 2/3 das lesões nos segmentos cervicais. O indivíduo com LM tem a úlcera por pressão (UPP) como uma das complicações mais frequentes. Estima-se que 70% dos pacientes com LM possuem UPP e entre 7 a 8% morrem por complicações decorrentes dessas lesões. A UPP é definida como área de necrose tecidual que se desenvolve quando um tecido mole é comprimido entre uma proeminência óssea e uma superfície dura por um período prolongado de tempo (NPUAP, 2009). **OBJETIVO:** Identificar, na literatura nacional e internacional, indexada nas bases de dados LILACS e MEDLINE, no período de 2001 a 2011, a produção e o conhecimento de UPP em pacientes com LM, e as características das publicações. **METODOLOGIA:** É uma revisão bibliográfica relacionada ao conhecimento de UPP em pacientes com LM indexados nas bases de dados LILACS, da BIREME, e MEDLINE pelo PubMed, referente ao período de 2001 a 2011. Foi utilizado um instrumento, discriminando os artigos quanto ao título, ano, autores, revista, local e objetivo do estudo, população, características e relevância para a enfermagem. Selecionou-se 27 artigos para análise com os critérios de inclusão: artigos publicados no período de 2001 a 2011, referentes a prevenção e tratamento de UPP em pacientes com LM. Excluíram 9, restando 18 artigos. Foram divididos em quatro categorias temáticas: I - dados sociodemográfico e clínicos dos indivíduos com LM; II - Nível da LM e associação com fatores causais; III - Estágio e localização das úlceras por pressão encontradas em indivíduos com LM; IV - Medidas de prevenção e tratamento de UPP realizadas em indivíduos com LM. **RESULTADOS:** Em relação à categoria profissional, tem-se que dos 11 artigos no LILACS, 6 eram de Enfermeiros e 5 de Médicos. No MEDLINE dos 7 (6) eram Médicos e 1 de Enfermeiros. Na distribuição geográfica no LILACS, observou-se a predominância de pesquisas brasileiras, no MEDLINE Norteamericanas. Sobre a abordagem metodológica dos 18 artigos (15) eram qualitativos e (3) quantitativos. Emergiram quatro categorias temáticas, com achados importantes no conhecimento de UPP, sendo necessário atualizações para manter a qualidade da assistência. **CONCLUSÃO:** Observou-se pouca quantidade de artigos referentes a prevenção e tratamento de UPP em LM. Demonstrando a necessidade de novas pesquisas que busque as melhores evidências clínicas na prevenção e tratamento de UPP.