Trabalho apresentado no 14º CBCENF

Título: NOTIFICAÇÕES DOS CASOS DE TOXOPLASMOSE NO BRASIL E NO MARANHÃO NO PERÍODO DE 2001 A 2006

Relatoria: RôMULO LUIZ NEVES BOGéA

Autores: Danielle Cardoso de Macedo
Kelly Portela Sousa
Rosana de Jesus Santos Martins
Patrícia Ribeiro Azevedo

Modalidade: Pôster

Área: A enfermagem e o terceiro setor

Tipo: Pesquisa

Resumo:

Introdução: A toxoplasmose é uma parasitose de ampla distribuição geográfica e que ocorre em todo mundo. A maior parte das infecções é assintomática, sendo a doença uma exceção no homem. O grande problema da toxoplasmose é quando atinge o feto, podendo causar graves sequelas. Objetivo: Mostrar a notificação dos casos de toxoplasmose no Brasil e no Maranhão no período de 2001 a 2006 com base em revisão bibliográfica e seus impactos sociais à população sob risco. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, cujas pesquisas foram realizadas em sites de busca como LILACS, BDENF e SCIELO. O período de pesquisa e construção do trabalho foi de 24 de outubro à 03 de novembro de 2010. Resultados: No Brasil, a prevalência de anticorpos na população adulta varia de 50 a 80%, com maiores índices em alguns estados no Norte e no Sul, sendo que a incidência aumenta com a idade. De acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde o maior surto de toxoplasmose mundial devido à contaminação hídrica por oocistos de T. gondii eliminados por um gato jovem com toxoplasmose ocorreu entre novembro de 2001 e janeiro de 2002, no Município de Santa Isabel do Ivaí – PR. De uma população de cerca de 9.000 habitantes, 426 pessoas apresentaram soropositividade sugestiva para o anticorpo IgM, significando infecção aguda. Em 2005, ocorreram 10 casos no município de Santa Vitória do Palmar – RS. Em 2006, 168 casos em Anápolis – GO e 11 casos em Goiânia – GO. Em São Luís – MA, em 06 de junho de 2006 houve 7 casos confirmados e em 19 de junho do mesmo ano foram notificados ainda 12 casos, entre eles uma gestante; todos moradores do mesmo condomínio. E não há relato na literatura de outros casos no interior do estado do Maranhão, o que pode nos sugerir subnotificações. Conclusão: Observou-se que a toxoplasmose é uma infecção, na maioria das vezes, assintomática, cujo tratamento é voltado para os sintomas/clínica e não para a infecção em si e que tem uma ampla distribuição geográfica. Os casos notificados no Brasil e no Maranhão geralmente acontecem devido a surtos, ocasionados, principalmente, pela contaminação hídrica por oocistos de T. gondii. O que nos direciona para a tomada de medidas preventivas principalmente na questão do saneamento básico e controle dos gatos contaminados.